

Склад

діюча речовина: ромашки квітки (Matricariae flores);

1 пачка містить: ромашки квіток (Matricariae flores) 40 г.

Лікарська форма

Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: суміш подрібнених, частково осипаних квіткових кошиків, трубчастих та несправжньоаязичкових квіток, квітколож. Колір від світло-жовтого до жовтуватого-зеленого з білими, коричнюватими краплями.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять спазмолітичну, болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну дію; знижують алергічні реакції, посилюють процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми кишечника, зменшують бродильні процеси.

Показання

Внутрішньо застосовувати при гастритах, запальних захворюваннях печінки та жовчного міхура, ентероколітах, метеоризмі, застудних захворюваннях.

Зовнішньо - при запальних захворюваннях порожнини рота і горла.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

3 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці, 1-3 років – по 1 десертній ложці, 6 місяців-1 рік – по $\frac{1}{2}$ -1 чайній ложці. Зовнішньо настій використовувати для полоскань 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Застосовувати дітям віком від 6 місяців за призначенням лікаря.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.