

## **Склад**

*діюча речовина: причепи трава (Bidentis herba);*

1 пачка містить: причепи трави (*Bidentis herba*) 50 г.

## **Лікарська форма**

Трава.

*Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, бутонів і квіток різної форми зеленого, бурувато-зеленого, зеленкувато-фіолетового кольору з грязнувато-жовтими вкрапленнями.*

## **Фармакотерапевтична група**

Дерматологічні препарати. Код АТХ D11A X.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини трави чинять сечогінну, потогінну, протизапальну, антиалергічну, жовчогінну і бактерицидну дію.

## **Показання**

Захворювання шкіри алергічного характеру, діатези, піодермії, псоріаз, екземи, нейродерміти. Захворювання сечовивідних шляхів, порушення обміну речовин, алергії; застудні захворювання (ГРЗ, грип) (у комплексному лікуванні).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки; дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки.

Зовнішньо настій використовувати для примочок та ванн.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 оС не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта

## **Діти**

Внутрішньо препарат не призначати дітям віком до 12 років.

## **Передозування**

Можливе посилення побічних реакцій.

## **Побічні реакції**

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка).

## **Термін придатності**

3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.