

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 г збору містить: топінамбура бульб (*Helianthi tubera*) 0,2 г; стевії листя (*Steviae folia*) 0,2 г; чорниці пагонів (*Vaccini myrtilli cormus*) 0,2 г; квасолі стулок плодів (*Phaseoli valvae fructum*) 0,2 г; чаю зеленого (*Thea chinensis*) 0,15 г; м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 0,05 г.

## **Лікарська форма**

Збір.

*Основні фізико-хімічні властивості:* суміш неоднорідних шматочків зеленого, темно-зеленого, сірувато-зеленого, буровато-зеленого, жовтувато-білого, світло-бурого або буро-коричневого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовують при діабеті. Код АТХ А10 Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини збору чинять гіпоглікемічну дію при цукровому діабеті II типу легкої та середньої тяжкості, що дає можливість у ряді випадків зменшити добові дози пероральних антидіабетичних засобів; регулюють функцію травного тракту, стимулюють активність підшлункової залози, нормалізують обмінні процеси, зменшують рівень холестерину у крові, проявляють протизапальні, жовчогінні та сечогінні властивості.

## **Показання**

Легкі та середні форми цукрового діабету II типу, захворювання травного тракту (ентероколіт, хронічний панкреатит, хронічний холецистит) – у складі комплексної терапії.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, круп; загострення хронічного панкреатиту, загострення хронічного ентероколіту, дискінезії жовчовивідних шляхів; спазмофілія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

### **Особливості застосування**

У пацієнтів зі шлунково-стравохідним рефлюксом можливе збільшення печії.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідома.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

### **Спосіб застосування та дози**

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) окропу, закрити і настоювати не менше 1 години. Настоювати рекомендується у термосі. Застосовувати у теплом вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 20-30 днів: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком 10-14 років – по ⅓-¼ склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки.

Через 7-10 діб курс лікування рекомендується повторити (після консультації з лікарем).

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 оС не більше 2 діб.

### **Діти**

Препарат застосовувати дітям від 7 років за призначенням лікаря.

### **Передозування**

Недотримання рекомендованих доз може призвести до болю у ділянці серця через вміст м'яги перцевої.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит).

**Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 3,0 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакетику, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.