

Склад

Діюча речовина: полину гіркого трава.

Лікарська форма

Трава.

Шматочки листя, стебел, кошиків різної форми сірого, зеленого, жовтого, зеленувато-сірого кольору.

Фармакотерапевтична група

Засоби для підвищення апетиту. Код АТС А15.

Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять протизапальну, антисептичну дію.

Показання

Для підвищення апетиту і покращання секреторної діяльності органів травлення при гастритах з пониженою секреторною функцією шлунка; у складі комплексної терапії холециститів, дискінезій жовчних шляхів.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба; наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія; епілепсія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано (препарат підвищує тонус матки).

Спосіб застосування та дози

2 чайні ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою доведи кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу. 3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

Курс лікування – 2-3 тижні. За призначенням лікаря курс можна повторювати. Між курсами обов'язкові перерви до 2 місяців.

Діти

Препарат застосовують дітям старше 5 років.

Побічні реакції

Можливі реакції підвищеної чутливості (в т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, блювання. При появі побічних реакцій препарат відміняють.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ЗАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.