

## **Склад**

*діюча речовина*: крушини кора (*Frangulae cortex*).

1 фільтр-пакет містить крушини кори (*Frangulae cortex*) – 2,5 г.

## **Лікарська форма**

Кора.

*Основні фізико-хімічні властивості*: подрібнена сировина: шматочки кори різної форми. Колір кори з зовнішньої сторони – сірувато-коричневий або темно-коричневий, з внутрішньої – оранжево-коричневий, червонувато-коричневий або темно-червоний.

## **Фармакотерапевтична група**

Контактні проносні засоби. Код АТХ А06АВ.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять м'яку проносну дію, механізм якої полягає у посиленні перистальтики товстої кишки, не подразнюючи слизової оболонки і не впливаючи на тонкий кишечник. Послаблювальна дія настає через 8-12 годин після приймання.

## **Показання**

Атонія кишечника, звичні запори.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі, синдром «гострого» живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани.

Особливі заходи безпеки. Тривалий прийом препарату призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту. Щоб запобігти звиканню, доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

### **Спосіб застосування та дози**

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Застосовувати у теплому вигляді дорослим по 100 мл на ніч, дітям віком від 12 років – по ¼-½ склянки (50-60 мл) на ніч.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

### **Діти**

Застосування препарату рекомендується дітям віком від 12 років.

### **Передозування**

При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. При появі вказаних симптомів слід припинити прийом препарату. Лікування – симптоматичне.

### **Побічні реакції**

При тривалому застосуванні можуть розвинутися: діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечника, атонія товстого кишечника, колікоподібний біль, алергічні реакції.

### **Термін придатності**

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 2,5 г у фільтр-пакетах; по 20 фільтр-пакетів в упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.