

## **Склад**

діюча речовина: фенхелю плоди (*Foeniculi fructus*);

1 пачка містить фенхелю плодів (*Foeniculi fructus*) 50 г.

## **Лікарська форма**

Плоди.

*Основні фізико-хімічні властивості:* плоди – вислоплодники, що розпадаються на два напівплодики (мерикарпії). Зовнішня сторона мерикарпії випукла, внутрішня – плоска. Кожен мерикарпій з п'ятьма дуже виступаючими поздовжніми реберцями. Колір зеленувато-бурий.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовують при функціональних розладах травного тракту. Код АТХ А03А Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини плодів чинять секретолітичну, спазмолітичну, вітрогінну, протимікробну та слабку сечогінну дію.

## **Показання**

Спазми кишечника, метеоризм, запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано у період вагітності. Посилює лактацію у період годування груддю.

## **Спосіб застосування та дози**

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3-4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 14 років - по  $\frac{1}{3}$  склянки, дітям віком 10-14 років - по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-10 років - по 2 столові ложки, 3-7 років - по 1 десертній ложці, дітям віком від 6 місяців до 3 років - по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 6 місяців.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21