

Склад

діюча речовина: кропиви листя.

Лікарська форма

Листя.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя різної форми. Колір темно-зелений, темно-сірувато-зелений, коричнювато-зелений, зелений.

Фармакотерапевтична група

Вітамін К та інші гемостатичні засоби. Код АТХ В02В Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять кровоспинну, діуретичну, загальнозміцнювальну, протизапальну та судинозвужувальну дію, сприяють збільшенню вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, нормалізують склад крові, знижують рівень цукру у крові, сприяють регенерації слизових оболонок травного тракту, нормалізують ліпідний обмін.

Показання

Легеневі, кишкові, маткові, гемороїдальні та інші кровотечі; анемії різної етіології, захворювання травного тракту (гастрити, коліти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її придатків; артеріальна гіпертонія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано у період вагітності. У жінок, які годують груддю, посилює лактацію.

Спосіб застосування та дози

2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати у проціджений настій. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 12 років – по $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ склянки, дітям віком 5-7 років – по 1 столовій ложці, 7-12 років – по 2 столові ложки. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). Нудота, блювання, діарея, біль у ділянці шлунка. У разі виникнення побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.