

## **Склад**

діючі речовини: 1 г збору містить: причепи трави (*Bidentis herba*) 0,1 г; ромашки квіток (*Matricariae flores*) 0,1 г; солодки коренів (*Glycyrrhizae radices*) 0,2 г; шавлії листя (*Salviae folia*) 0,2 г; евкаліпта прутовидного листя (*Eucalypti viminalis folia*) 0,2 г; календули квіток (*Calendulae flores*) 0,2 г.

## **Лікарська форма**

Збір.

*Основні фізико-хімічні властивості:* суміш шматочків різної форми сіро-зеленого кольору з оранжево-жовтими, білими і коричневими вкрапленнями; запах ароматний.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні і дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

## **Фармакодинаміка**

Компоненти препарату чинять антимікробну дію відносно стафілокока, кишкової та синьогнійної паличок, вульгарного протею, пухнастого мікроспоруму та деяких інших мікроорганізмів; виявляють протизапальні властивості і стимулюють репаративні процеси.

## **Показання**

У комплексній терапії гострих і хронічних захворювань вуха, горла та носа; запальних захворювань ротової порожнини та травного тракту.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки або нирок; гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренкортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.

## **Особливості застосування**

З обережністю застосовувати хворим на міокардит, перикардит, інфаркт міокарда, брадикардію.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплом вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям 3-7 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-12 років – по  $\frac{1}{2}$  склянки, 12-14 років – по  $\frac{2}{3}$  склянки. Місцево настій застосовувати для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

## **Передозування**

Тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія шкіри, утворення набряків), підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.