

## **Склад**

*діюча речовина:* м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*);

1 пачка містить м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 50 г.

## **Лікарська форма**

Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя різної форми з домішками шматочків стебел від світло-зеленого до темно-зеленого або коричнювато-зеленого кольору, іноді з коричнювато-фіолетовими краплями.

## **Фармакотерапевтична група**

Протиблювальні засоби і препарати, що усувають нудоту. Код АТХ А04А D.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, седативну і слабку гіпотензивну дію; підвищують секрецію травних залоз, збуджують апетит, пригнічують процеси гниття і бродіння у травному каналі, знижують тонус гладеньких м'язів кишечника, жовчо- та сечовивідних шляхів, посилюють виділення жовчі.

## **Показання**

Захворювання травного тракту (нудота різного походження, кишкові коліки, метеоризм, спазми травного тракту); захворювання печінки (холецистит, гепатит, холангіт, жовчокам'яна хвороба), як легкий заспокійливий засіб (у складі комплексної терапії).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Спазмофілія, круп, бронхіальна астма.

Особливі заходи безпеки. Пацієнтам з шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування листя м'яти перцевої, оскільки може посилитися печія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 15 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  склянки, дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

## **Передозування**

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

### **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.