

Склад

діюча речовина: кукурудзи стовпчики з приймочками.

Лікарська форма

Стовпчики з приймочками різано-пресовані.

Шматочки циліндричної форми, діаметром 5 мм, довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір від світло- до темнокоричневого. Запах слабкий, своєрідний; смак з відчуттям слизистої.

Фармакотерапевтична група

Засоби що застосовуються при біліарній патології. Код АТС А05А Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, діуретичну (збільшують на 150-160% відтік сечі), кровоспинну і гіпоглікемічну дію; збільшують секрецію жовчі, зменшують її в'язкість, знижують вміст білірубіну, підвищують вміст протромбіну в крові і прискорюють її згортання, сприяють виведенню з сечею уратів, оксалатів, фосфатів.

Показання

Холецистити, холангіти, гепатити з порушенням жовчовиділення; цистити, сечокам'яна хвороба, набряки; геморагічні діатези, кровотечі, спричинені зниженням рівня протромбіну (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, збільшений протромбіновий індекс, тромбофлебіт, жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, обтураційна жовтяниця, анорексія.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

1 десертну ложку стовпчиків з приймочками помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям старше 14 років - по 1-3 столові ложки; дітям віком 10-14 років - по 1 столовій ложці, 7-10 років - по 1 десертній ложці, 3-7 років - по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовують дітям старше 3 років.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т.ч. почервоніння, висип, риніт).

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій - при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Виробник

ЗАЗ "Ліктрави".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.