

Склад

діюча речовина: крушини кора (Frangulae cortex).

1 пачка містить крушини кори (Frangulae cortex) – 75 г.

Лікарська форма

Кора.

Основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: шматочки кори різної форми. Колір кори з зовнішньої сторони – сірувато-коричневий або темно-коричневий, з внутрішньої – оранжево-коричневий, червонувато-коричневий або темно-червоний.

Фармакотерапевтична група

Контактні проносні засоби. Код АТХ А06АВ.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять м'яку проносну дію, механізм якої полягає у посиленні перистальтики товстої кишки, не подразнюючи слизової оболонки і не впливаючи на тонкий кишечник. Послаблювальна дія настає через 8-12 годин після приймання.

Показання

Атонія кишечника, звичні запори.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі, синдром «гострого» живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани.

Особливі заходи безпеки. Тривалий прийом препарату призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту. Щоб запобігти звиканню, доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді дорослим по $\frac{1}{2}$ склянки на ніч, дітям віком від 12 років – по $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ склянки на ніч. Перед застосуванням відвар збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Застосування препарату рекомендується дітям віком від 12 років.

Передозування

При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. При появі вказаних симптомів слід припинити прийом препарату. Лікування – симптоматичне.

Побічні реакції

При тривалому застосуванні можуть розвинутися: діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечника, атонія товстого кишечника, колікоподібний біль, алергічні реакції.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.