

Склад

діюча речовина: березові бруньки;

1 пачка містить березових бруньок 10 г.

Лікарська форма

Бруньки.

Основні фізико-хімічні властивості: бруньки подовжено-конічні, загострені або притуплені, часто клейкі. Колір бруньок коричневий, біля основи іноді зеленкуватий.

Фармакотерапевтична група

Нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю. Код АТХ C03B X.

Фармакодинаміка

Березові бруньки містять ефірну олію, сапоніни, флавоноїди (апігенін, ізорафнетин), дубильні речовини, смоли, аскорбінову і ніотинову кислоти, каротин і гіперозид. Настій із березових бруньок чинить сечогінну, жовчогінну, спазмолітичну, протизапальну, антисептичну, ранозагоювальну, відхаркувальну, антивірусну та протипаразитарну дію.

Показання

Хронічні запальні захворювання нирок та сечового міхура; сечокам'яна хвороба; набряки серцевого походження; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів із порушенням жовчовиділення; ларингіти, бронхіти, трахеїти.

Протипоказання

Ниркова недостатність, гострі запальні захворювання нирок, гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату, наявність в анамнезі кровотеч з органів малого тазу; анемія; епілепсія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не призначати у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку бруньок помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою та настояти на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплом вигляді по $\frac{1}{3}$ склянки 2–3 рази на добу за 15–20 хвилин до їди. Діти віком 12–14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ склянки 2–3 рази на добу за 15–20 хвилин до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 °C) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Не призначати дітям віком до 12 років.

Передозування

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції

Діарея. Можливі прояви подразнювальної дії настою на тканину нирок; алергічні реакції, включаючи свербіж, висипання на шкірі, алергічний риніт, кропив'янку, гіперемію та набряк шкіри. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

По 10 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.