

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 г збору містить: топінамбура бульб (Helianthi tubera) 0,2 г; стевії листя (Steviae folia) 0,2 г; чорниці пагонів (Vaccini myrtilli cormus) 0,2 г; квасолі стулок плодів (Phaseoli valvae fructum) 0,2 г; чаю зеленого (Thea chinensis) 0,15 г; м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 0,05 г.

## **Лікарська форма**

Збір.

*Основні фізико-хімічні властивості:* суміш неоднорідних шматочків зеленого, темно-зеленого, сірувато-зеленого, буровато-зеленого, жовтувато-білого, світлобурого або буро-коричневого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовують при діабеті. Код ATХ A10 X.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини збору чинять гіпоглікемічну дію при цукровому діабеті II типу легкої та середньої тяжкості, що дає можливість у ряді випадків зменшити добові дози пероральних антидіабетичних засобів; регулюють функцію травного тракту, стимулюють активність підшлункової залози, нормалізують обмінні процеси, зменшують рівень холестерину у крові, проявляють протизапальні, жовчогінні та сечогінні властивості.

## **Показання**

Легкі та середні форми цукрового діабету II типу, захворювання травного тракту (ентероколіт, хронічний панкреатит, хронічний холецистит) – у складі комплексної терапії.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, круп; загострення хронічного панкреатиту, загострення хронічного ентероколіту, дискінезії жовчовивідних шляхів; спазмофілія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

У пацієнтів зі шлунково-стравохідним рефлюксом можливе збільшення печії.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідома.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

## **Способ застосування та дози**

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 300 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 20-30 днів: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{2}$  склянки, дітям віком 10-14 років – по  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$  склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки. Перед застосуванням настій збовтати.

Через 7-10 діб курс лікування рекомендується повторити (після консультації з лікарем).

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям від 7 років за призначенням лікаря.

## **Передозування**

Недотримання рекомендованих доз може привести до болю у ділянці серця через вміст м'яти перцевої.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, крапив'янка, контактний дерматит).

### **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.