

## **Склад**

діюча речовина: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*);

1 фільтр-пакет містить: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 1,5 г.

## **Лікарська форма**

Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя і стебел різної форми зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, фіолетово-бурого або фіолетово-коричневого кольору з вкрапленнями жовтувато-білого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Рослинні засоби з діуретичним ефектом. Код АТХ С03В Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини листя чинять діуретичну, спазмолітичну і жовчогінну дію; підвищують секрецію шлункового соку, збільшують у ньому вміст вільної соляної кислоти, виводять з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди.

## **Показання**

Гострі та хронічні захворювання нирок, холецистити; набряки, спричинені порушеною функцією нирок або серцевою недостатністю (у складі комплексної терапії).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; гіперацидний гастрит, виразкова хвороба.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком 12-14 років – по ⅓ склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці. При холециститах застосовувати після їди.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

## **Передозування**

При передозуванні можливий біль у ділянці нирок, печінки, шлунка.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.