

## **Склад**

*діючі речовини:* цинку сульфату гептагідрат, кислота борна;

1 мл препарату містить цинку сульфату гептагідрату 2,5 мг, кислоти борної 20 мг;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

## **Лікарська форма**

Краплі очні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, які застосовуються в офтальмології. Протимікробні препарати. Сполуки цинку. Код АТХ S01A X03.

## **Фармакодинаміка**

Лікарський засіб чинить антимікробну дію при місцевому застосуванні щодо більшості грампозитивних та грамнегативних бактерій, у тому числі синьогнійної палички.

Препарат добре проникає крізь кон'юнктивальну оболонку, особливо у дітей.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалася.

## **Показання**

Кон'юнктивіти бактеріальної етіології.

## **Протипоказання**

Застосування протипоказане при підвищеній чутливості до компонентів препарату, при порушенні функції нирок, печінки.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не встановлена.

## **Особливості застосування**

Запобігати тривалому застосуванню препарату та перевищенню рекомендованих доз, особливо у дітей з 12 років.

При тривалому застосуванні препарату (більше одного місяця) можуть виникати симптоми хронічної інтоксикації: місцевий набряк тканин, запаморочення, стоматит, екзема, порушення менструального циклу у жінок, анемія, міалгія, судоми, гарячка, порушення функції нирок, електролітний дисбаланс, дегідратація.

У цих випадках препарат відмінюють, проводять симптоматичне лікування.

У разі випадкового вживання препарату внутрішньо можливі симптоми гострого отруєння: нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, порушення дихання, еритематозний висип. При цьому проводять зондове промивання шлунка, призначають внутрішньо сольові проносні засоби, ентеросорбенти (активоване вугілля), симптоматичну терапію. У разі тяжкого отруєння вживають заходи щодо підтримання життєво важливих функцій організму, проводять гемодіаліз або перитонеальний діаліз.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідомо.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування лікарського засобу у період вагітності протипоказане.

У разі необхідності лікування препаратом годування груддю потрібно припинити.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим та дітям віком від 12 років закапувати піпеткою по 2 краплі препарату 2–3 рази на день у кожне око. Курс лікування 1–3 тижні.

## **Діти**

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

## **Передозування**

При частому застосуванні препарату (частіше 3 разів на добу протягом курсу лікування) можливе його передозування, що супроводжується симптомами хронічної інтоксикації. Показана відміна препарату, симптоматична терапія.

## **Побічні реакції**

При місцевому застосуванні можливі місцеві алергічні реакції, почервоніння, свербіж, набряк повік, подразнення та біль у оці.

При тривалому або частому застосуванні можуть спостерігатися явища загальнорезорбтивної дії, при системних реакціях відмічається нудота, блювання, діарея, дегідратація, шкірні висипи, біль у м'язах, головний біль, можливе порушення функції нирок, печінки, особливо у дитячому віці.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 10 мл у флаконах.

## **Категорія відпуску**

За рецептом.

## **Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).