

## **Показання до застосування**

- Гиполакрімія (стабілізація слізної плівки).
- Синдром Сьогрена (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія).
- Ендокринна офтальмопатія (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, гипоглікемічна дія, нейромедіаторна дія).
- Клімактеричний синдром (стабілізація слізної плівки, імунокорегуючий ефект).
- Нейропаралітичний кератит (антиоксидантна дія, гипоглікемічна дія, нейромедіаторна дія).
- Синдром сухого ока та його профілактика (стабілізація слізної плівки).
- Травми ока (антибактеріальна дія, стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, нейромедіаторна дія, протинабрякова, знеболююча дія).
- Дистрофічні зміни рогівки (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, протинабрякова дія, активізація обміну амінокислот).
- Дегенеративні зміни рогівки (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, стабілізація обміну білків, імунокорегуючий ефект).
- Катаракта (антиметаболітна дія, антиоксидантна дія, стабілізація обміну білків).
- Аномалії рефракції: гіперметропія, міопія, астигматизм (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, активізація обміну амінокислот).
- До та після проведення кераторефракційних операцій: фоторефракційної кератотомії, ЛАСИК тощо (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, протинабрякова дія, активізація обміну амінокислот).
- Оперативні втручання на передньому сегменті ока (стабілізація слізної плівки, антиоксидантна дія, протинабрякова дія, активізація обміну амінокислот, нейромедіаторна дія, знеболююча дія).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до будь-яких компонентів продукту або інших хімічно споріднених речовин.

## **Особливості застосування**

- Розчин є стерильним до відкриття флакона.
- Щоб запобігти забрудненню розчину, щільно закривайте флакон після використання і не торкайтесь кінчиком дозатора до ока або до інших предметів.

- Якщо медичний виріб у вигляді офтальмологічного розчину використовується з метою лікування, слід звернутися до лікаря.
- Не використовуйте у випадку очної інфекції.
- Не використовуйте Лакрисек Плюс з іншими офтальмологічними засобами. Перед закапуванням другої краплі розчину почекайте 10 хвилин.
- Не використовуйте розчин, якщо флакон пошкоджений.
- Продукт призначений тільки для зовнішнього застосування в офтальмології. Не використовуйте з контактними лінзами.

## **Спосіб застосування**

Закапувати по 1 або 2 краплі в кон'юнктивальний мішок 4 рази на день або за вказівкою лікаря.

## **Побічні реакції**

Після закапування може спостерігатися тимчасова нечіткість зору. Рекомендується почекати кілька секунд, перш ніж починати будь-яку діяльність, що вимагає чіткості зору. У разі будь-якої небажаної реакції слід припинити використання розчину і проконсультуватися з лікарем.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати препарат через 30 днів після відкриття флакона. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від 4 до 25 ° С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

## **Упаковка**

По 8 мл у флаконі в картонній упаковці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Bioos Italia Srl (Італія).