

## **Склад**

Лактоферин, гідроксипропіл метилцелюлоза, натрію N-гідроксиметилгліцинат, натрієва сіль EDTA, гідроксид калію, одноосновний фосфат натрію, двоосновний фосфат натрію, хлорид натрію, вода очищена.

## **Опис**

Лакто - це офтальмологічний розчин, що містить гіпромелозу, яка змачує та зволожує очну поверхню.

Лакто корисний у всіх випадках змін слізної плівки, що викликані: потраплянням сонячних променів, дією атмосферних агентів, випромінюванням відеопристроїв. У систему консервантів входить лактоферин, речовина зазвичай присутня в слізній рідині, яка, захоплюючи залізо, допомагає гальмувати ріст мікробів.

## **Показання**

Лакто показаний при лікуванні сухості очей та симптомів, пов'язаних із прогресуючими запальними станами.

## **Попередження**

- Випадки кальцифікації рогівки, пов'язані із застосуванням очних крапель, що містять фосфати, зустрічалися дуже рідко у пацієнтів з дуже пошкодженою рогівкою. У разі стрічкоподібної кератопатії або відкладень кальцію на рогівці, проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед використанням очних крапель.
- Стерильний до відкриття.
- Щоб запобігти можливому забрудненню, не допускайте контакту кінчика крапельниці з будь якою поверхнею або оком.
- Після використання пляшку щільно закрийте.
- Не застосовуйте у разі специфічної гіперчутливості до будь-якого з інгредієнтів.
- Не використовуйте, якщо упаковку пошкоджено.
- У разі побічних реакцій негайно припиніть лікування та зверніться до вашого лікаря.
- Не ковтайте.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

- Необхідно використати протягом 30 днів після відкриття. Викиньте залишки.
- У випадку постійних проблем проконсультуйтеся з лікарем.
- Не використовуйте постійно більше, ніж 30 днів.

### **Спосіб застосування та дози**

Тривалість лікування та дозування повинен вказати ваш лікар-офтальмолог.  
Рекомендоване дозування - 1-2 краплі в око.

1. Вимийте руки.
2. Відкрутіть ковпачок.
3. Тримайте пляшку догори дном між великим і іншим пальцями.
4. Відведіть нижнє повіко вниз.
5. Утримуйте кінчик пляшки біля ока, не торкаючись очей або сусідніх областей.
6. Нанесіть рекомендовану кількість крапель і обережно закрийте повіки, щоб рівномірно розподілити продукт на поверхні очей.
7. Повторіть процедуру для іншого ока, якщо це рекомендує ваш лікар-офтальмолог.
8. Після застосування щільно закрийте пляшку, щоб уникнути забруднення.

### **Умови зберігання**

Зберігати подалі від джерел тепла в недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 30°C.

### **Упаковка**

По 15 мл в флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Італдевайс С.Р.Л. Новакс Фарма, Франція.