

Склад

Поліетилен гліколь 400, пропіленгліколь, гідроксипропил гуар, борна кислота, кальцію хлорид, магнію хлорид, калію хлорид, натрію хлорид, цинку хлорид, поліквад (полідронія хлорид) 0,001%.

Показання

Багато несприятливих чинників, такі як пил, дим, озон, ультрафіолетові промені, сухе тепло (радіатори, сауна та ін.), кондиціювання повітря, вітер, протяги, застосування косметики, тривала робота за комп'ютером і перегляд телевізора можуть викликати відчуття сухості очей, подразнення, печіння, різь, відчуття присутності стороннього тіла та інші.

Протипоказання

Алергічні реакції на будь-який з компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Очні краплі можна використовувати в будь-який час, коли це необхідно.

Закапайте розчин в око і моргнути кілька разів.

Запобіжні заходи

Не використовуйте залишок розчину більше 6-ти місяців після першого відкриття флакона.

Не використовуйте розчин після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не застосовувати препарат розчин, якщо упаковка розкрита або пошкоджена.

Щоб використовувати препарат за призначенням дотримуйтесь вказівок вашого офтальмолога і вкладеної інструкції.

Якщо при застосуванні препарату ви відчуваєте постійний дискомфорт в очах, зміни бачення, надмірне сльозотеча і почервоніння очей, обов'язково зверніться до вашого офтальмолога.

Щоб уникнути забруднення розчину не торкайтеся кінчиком крапельниці до жодних поверхонь.

Після закапування можлива тимчасова неясність зору або інші візуальні занепокоєння, що може негативно вплинути на здатність керувати автомобілем або іншими потенційно небезпечними механізмами. В цьому випадку необхідно почекати деякий час до відновлення бачення.

Одягайте ковпачок після використання.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі і в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 мл у флаконі, по 1 флакону в упаковці.

Виробник

Alcon Laboratories Inc, США.