

## **Склад**

*1 мл містить:*

- Пропіленгліколь - 6,0 мг.
- Гідроксіпропілгуар - 0,5 мг.
- Мінеральне масло - 10 мг.
- дімірстоіл фосфатіділгліцерол - 0,05 мг.
- Поліоксил 40 стеарат - 3,8 мг.
- Сорбітан тристеарат - 2,9 мг.
- Кислоту борну - 10,0 мг.
- Сорбітол - 7,0 мг.
- Динатрію едетат - 0,25 мг.
- Поліквад® (полікватерний-1) - 0,01 мг.
- Кислоту хлористоводородну і / або натрію гідроксид (для доведення рН).
- Воду очищену - до обсягу 1 мл.

## **Лікарська форма**

Краплі для очей. Засіб для зволоження очей.

## **Показання**

Засіб зволожує поверхню очей, стабілізує ліпідний шар слізної плівки і зменшує випаровування слізної рідини. Забезпечує тимчасове полегшення симптомів синдрому «сухого ока», таких як відчуття печіння і подразнення.

## **Протипоказання**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Особливості застосування**

Не торкайтеся до кінчика піпетки флакона, так як це може призвести до забруднення розчину.

Дотримуйтесь рекомендацій Вашого лікаря-офтальмолога та інструкції по застосуванню.

При триваючому дискомфорті, сльозотечі, зміні зору, почервонінні очей, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем.

Не застосовувати препарат розчин, якщо упаковка розкрита або пошкоджена.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Безпека і ефективність застосування під час вагітності та лактації не досліджувалися. Можливе застосування при вагітності та в період лактації за призначенням лікаря, якщо очікуваний ефект перевищує ризик розвитку можливих побічних ефектів.

### **Спосіб застосування та дози**

Перед застосуванням флакон струшувати.

Засіб офтальмологічне може застосовуватися в міру необхідності протягом дня.

Закапайте 1-2 краплі в кожне око і поморгайте.

Засіб офтальмологічне може використовуватися для усунення симптомів синдрому «сухого ока», спричиненого носінням контактних лінз, шляхом закопування в кожне око до надягання і після зняття контактних лінз.

### **Діти**

Не рекомендується застосування в дитячому віці до 18-ти років, так як безпека і ефективність застосування у дітей не встановлені.

### **Термін придатності**

Не використовуйте розчин більше 6-ти місяців після першого відкриття флакона.

Не використовуйте розчин після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці.

Зберігайте флакон щільно закритим.

### **Упаковка**

По 10 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

Alcon Laboratories Inc. (США)