

## **Склад**

*діюча речовина:* фенольний гідрофобний препарат прополісу;

1 супозиторій містить фенольного гідрофобного препарату прополісу (у перерахуванні на 50 % вміст суми фенольних сполук) 0,1 г (100 мг);

*допоміжні речовини:* диметилсульфоксид, пропіленгліколь, твердий жир.

## **Лікарська форма**

Супозиторії.

*Основні фізико-хімічні властивості:* супозиторії від світло-коричневого до темно-коричневого кольору, кулеподібної форми, зі специфічним запахом.

Допускається наявність нальоту і неоднорідність забарвлення у вигляді вкраплень та мармуровості.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати для лікування геморою і анальних тріщин для місцевого застосування. Код АТХ С05А Х.

## **Фармакодинаміка**

Фенольний гідрофобний препарат прополісу забезпечує протизапальну, репаративну та антимикробну дію. Присутність димексиду у складі супозиторіїв доповнює спектр активності препарату знеболювальними властивостями, підвищує резорбцію фармакологічних речовин крізь слизову оболонку.

Пропіленгліколь і основа створюють умови для реалізації терапевтичних ефектів діючих речовин супозиторіїв.

## **Фармакокінетика**

Немає даних.

## **Показання**

Проктити, анальні тріщини, післяопераційні рани дистального відділу прямої кишки.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату, алергічні реакції на продукти бджільництва.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Можна застосовувати у комбінації з іншими препаратами, призначеними для лікування супутніх захворювань. Не рекомендоване одночасне застосування з іншими продуктами бджільництва.

## **Особливості застосування**

Перед застосуванням супозиторія необхідно:

- по лінії перфорації блістерної упаковки відірвати один супозиторій у первинній упаковці;
- далі необхідно потягнути за краї плівки, розриваючи її у різні боки, і звільнити супозиторій від первинної упаковки.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Будь-яких даних щодо впливу препарату на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами немає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе за призначенням лікаря у випадку, коли очікувана користь для жінки переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим і дітям віком від 7 років – по 1 супозиторію 3 рази на добу після спорожнення кишечника. Тривалість лікування визначає лікар залежно від тяжкості захворювання. Курс лікування може становити від 8-10 днів до 14-21 дня.

## **Діти**

Препарат не застосовується для лікування дітей віком до 7 років.

## **Передозування**

Не встановлено.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру](#)

лікарських засобів України.