

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 супозиторій містить: 387,10 мг стандартизованої суспензії культури бактерій (містить  $6,6 \times 10^8$  E.coli, убитих і законсервованих у 6,6 мг зрідженого фенолу);

*допоміжні речовини:* твердий жир, олія рицинова поліетоксильована, гідрогенізована.

## **Лікарська форма**

Супозиторії.

*Основні фізико-хімічні властивості:* однорідні супозиторії, від білого до бежевого кольору, з характерним запахом фенолу.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування.  
Код АТХ С05А Х.

## **Фармакодинаміка**

Препарат стимулює процеси місцевого імунітету за рахунок антигенної дії, спричиняючи як неспецифічну, так і специфічну імунні реакції, внаслідок чого підвищується місцевий імунний опір. Прискорює та покращує загоювання ран, має протизапальний ефект, попереджає реінфекцію та суперінфекцію.

## **Фармакокінетика**

Внаслідок сорбції або трансцитозу компоненти суспензії культури бактерій діють як антигени та ініціюють процес місцевої імунізації, що, у свою чергу, спричиняє захисну імунну реакцію.

## **Показання**

Місцеве лікування симптомів геморою.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

### **Особливості застосування**

У випадку грибкових інфекцій необхідно одночасно застосовувати місцевий протигрибковий лікарський засіб.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Дані відсутні.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Для застосування препарату у період вагітності або годування груддю протипоказань немає.

### **Спосіб застосування та дози**

Перед застосуванням необхідно здійснити гігієнічні процедури анальної ділянки. Застосовувати ректально, дорослим по 1 супозиторію 2 рази на добу (зранку та ввечері), по можливості після дефекації.

Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай термін застосування становить 5–7 днів.

### **Діти**

Не застосовувати дітям.

### **Передозування**

Про випадки передозування або інтоксикації не повідомлялося. У разі випадкового перорального введення супозиторіїв (наприклад, дітьми) можливі розлади шлунково-кишкового тракту (біль у животі, нудота).

### **Побічні реакції**

В окремих випадках у хворих із підвищеною чутливістю до компонентів супозиторіїв Постеризан можуть спостерігатися реакції гіперчутливості, включаючи свербіж і печіння.

Може спричиняти контактний дерматит (наприклад, через гіперчутливість до фенолу).

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.

## **Упаковка**

По 5 супозиторіїв у стрипі.

По 2 стрипи в картонній пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Др. Каде Фармацевтична фабрика ГмбХ.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Рігіштрассе, 2, 12277 Берлін, Німеччина.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).