

Склад

активна речовина: натрієва сіль гіалуронової кислоти (5 мг);

допоміжні речовини: масляний екстракт Центел азіатської, масляний екстракт календули, масляний екстракт алое вера, ефірну олію чайного дерева, напівсинтетичні гліцериди, ВНТ.

Фармакодинаміка

Дія препарату Проктіс-М обумовлено міститься в складі гіалуронової кислоти, мукополісахаридів, який є у всіх тканинах організму. Дана речовина надає структурну підтримку, надаючи тканинам тонус, харчування і еластичність.

Велика кількість досліджень довели здатність гіалуронової кислоти прискорювати та покращувати процес епітелізації і відновлення тканини.

Показання

- Внутрішній і зовнішній геморой;
- криптит;
- проктит;
- анальна тріщина;
- періанальні фістули;
- фісур;
- посилення репаративних процесів в аноректальному каналі після проктологічних операцій.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Перед і після застосування супозиторіїв обов'язково вимийте руки.

Відкрийте супозиторій, потягнувши за дві попередньо розрізані половинки блістери. Дозування - 1 супозиторій 1 раз на добу. Тривалість курсу лікування визначається індивідуально, залежно від симптомів захворювання. У разі необхідності препарат можна використовувати тривалий час.