

Склад

10 г містить: масло сосни звичайної - 685 мг, олія евкаліптова - 432.5 мг. α -токоферолу ацетат - 288,5 мг, тимол - 21.75 мг, левоментол - 72.25 мг;

допоміжні речовини: вазелін білий, віск білий, макрогола і гліцеридів абрикосового масла ефіри (лабрафіл М-1944 СS), бутилгідроксіанізол.

Лікарська форма

Мазь.

Мазь назальна білого кольору, прозора, з запахом ефірних масел.

Фармакотерапевтична група

Препарат з протимікробним та протизапальну дію для місцевого застосування в ЛОР-практиці.

Деконгестантів і інші препарати для місцевого застосування. Код АТХ R01A.

Фармакодинаміка

Протівоконгестивное засіб рослинного походження. Має протизапальну й антисептичну дію.

Фармакокінетика

Дані про фармакокінетику препарату не надані.

Показання

- Гострі і хронічні запальні захворювання слизових оболонок носа і носоглотки, що супроводжуються висиханням слизових оболонок носа;
- стану після операцій в порожнині носа і тампонади носа (в умовах стаціонару та амбулаторно).

Протипоказання

- Алергічний риніт;
- дитячий вік до 2 років;
- підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Лекарственное взаимодействие препарата Пиносол® не описано.

Особливості застосування

Необхідно уникати потрапляння препарату на слизову оболонку очей.

При появі небажаних явищ або інших незвичайних реакцій, які не описаних в інструкції, пацієнту необхідно звернутися до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

При застосуванні препарату здатність до концентрації уваги не знижується.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Можливе застосування мазі назальної Піносол® при вагітності і в період лактації (грудного вигодовування).

Спосіб застосування та дози

Режим дозування

Дорослим і дітям старше 2 років препарат наносять в кількості приблизно 0.5 см в кожную ніздрю на поверхню слизової оболонки передніх відділів носової порожнини. Для введення можна використовувати ватяний тампон (паличку, обгорнуту в кінці грудочкою вати). Потім помірним натисканням на крила носа розтирають мазь по слизовій оболонці носа.

Процедуру повторюють 3-4 рази / добу. Тривалість лікування становить 7-14 днів. Збільшення тривалості курсу лікування можливо за рекомендацією лікаря.

Діти

Препарат призначають дітям старше 2 років.

Передозування

До теперішнього часу випадків передозування не спостерігалось.

Побічні реакції

Місцеві реакції: свербіж, печіння, почервоніння або набряк слизової оболонки носової порожнини.

Інші: алергічні реакції.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Препарат слід зберігати в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі від 15 ° до 25 ° С.

Упаковка

Туба 10 г у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Саньок Фармасьютикалз».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Нітрянська 100, 920 27 Глоговець, Словацька Республіка.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).