

## **Склад**

*діюча речовина:* альбумін чорний харчовий;

1 плитка містить альбуміну чорного харчового 2,5 г;

*допоміжні речовини:* молоко згущене з цукром, патока крохмальна, сахароза, ванілін.

## **Лікарська форма**

Плитки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рельєфні плитки коричневого або темно-коричневого кольору, розподілені вздовж і поперек рисками на пластинки, солодкого смаку, зі слабким запахом ваніліну.

## **Фармакотерапевтична група**

Різні речовини, які впливають на травну систему і метаболізм. Код ATХ A16A X.

## **Фармакодинаміка**

Гематоген – засіб корекції метаболічних процесів. Джерело повноцінного білка, жирів, вуглеводів та мінералів, що містяться у пропорціях, близьких до складу крові людини. Препарат стимулює кровотворення, сприяє всмоктуванню заліза у кишечнику, підвищує вміст гемоглобіну у крові, регулює окисно-відновлювальні процеси в організмі.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалася.

## **Показання**

Як допоміжний засіб при анеміях різного генезу, особливо постгеморагічній і залізодефіцитній; станах, що супроводжуються гіпотрофією, кахексією; у період реконвалесценції після різних захворювань.

## **Протипоказання**

- Підвищена чутливість до компонентів препарату;

- анемії, що не пов'язані з дефіцитом заліза;
- порушення вуглеводного обміну

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не встановлена.

## **Особливості застосування**

Рекомендується дотримуватися режиму дозування препарату.

Оскільки до складу препарату входить сахароза, пацієнтам зі спадковими формами непереносимості фруктози, недостатністю сахарази-ізомальтази не можна застосовувати цей препарат.

**Препарат слід з обережністю застосовувати пацієнтам, хворим на цукровий діабет.**

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Немає даних щодо негативного впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування препаратору у період вагітності або годування груддю можливе тільки після консультації лікаря, який визначить співвідношення користь/ризик.

## **Спосіб застосування та дози**

Гематоген приймати внутрішньо. З профілактичною метою призначати дітям віком від 2 років, підліткам і дорослим – по 1-2 пластинки 2-3 рази на добу протягом 1-2 місяців. У період реконвалесценції після перенесеної залізодефіцитної анемії препарат призначати по 2 плитки на добу протягом 2 місяців.

## **Діти**

Данну лікарську форму призначати дітям віком від 2 років.

## **Передозування**

Про випадки передозування не повідомлялося.

### **Побічні реакції**

*Травний тракт:* нудота, діарея.

В осіб з підвищеною чутливістю можливе виникнення алергічних реакцій.

### **Термін придатності**

1 рік.

### **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 40 г в поліетиленовій упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «Натур+».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-б.