

Склад

Кальцію карбонат, кальцію фосфат двоосновний дигідрат, магнію оксид, калію хлорид, аскорбінова кислота, DL-альфа-токоферолу ацетат, наповнювач - мікрокристалічна целюлоза, стабілізатор - стеаринова кислота, антиспікаючий агент - кремнію діоксид, оболонка таблетки «Opadry White II» гідроксипропілцелюлоза, барвник - титану діоксид, наповнювач - полідекстроза, антиспікуючий агент - тальк, мальтодекстрин, із середньої тригліцериди), заліза фумарат, ніацинамід, цинку оксид, стабілізатор - натрію кроскармеллоза, ретинолу астетанат, D хлорид, марганцю сульфат моногідрат, холекальциферол, піридоксину гідрохлорид, D-біотин, оксид міді, фолієва кислота, тіаміну гідрохлорид, калію йодид, рибофлавін, натрію борат, натрію молібдат, натрію метаванадату, філлохін.

1 таблетка (1430 мг) містить:

- Вітамін А – 1888,0 мкг;
- Йод – 150,0 мкг;
- Бета-каротин – 112,0 мкг;
- Кальцій – 200,0 мг;
- Вітамін В1 – 1,5 мг;
- Калій – 80,0 мг;
- Вітамін В2 – 1,7 мг;
- Фосфор – 48,0 мг;
- Вітамін В3 – 20,0 мг;
- Магній – 100,0 мг;
- Вітамін В6 – 3,0 мг;
- Залізо – 9,0 мг;
- Вітамін В12 – 6,0 мкг;
- Мідь – 2,0 мг;
- Вітамін D3 – 10,0 мкг;
- Цинк – 15,0 мг;
- Вітамін Е – 30,1 мг;
- Марганець – 2,5 мг;
- Вітамін С – 60,0 мг;
- Ванадій – 10,0 мкг;
- Пантотенова кислота – 10,0 мг;
- Бор – 0,150 мг;
- Фолієва кислота - 200,0 мкг;
- Селен – 20,0 мкг;
- Біотин – 30,0 мкг;

- Молібден – 25,0 мкг;
- Вітамін К1 – 10,0 мкг;
- Хром – 100,0 мкг;
- Хлор – 72,0 мг.

Опис

- Вітамін А забезпечує нормальну функцію органу зору, структурну цілісність тканин та належний рівень імунітету.
- Бета-каротин є джерелом синтезу вітаміну А, захищає клітинні мембрани від продуктів окислення ліпідів.
- Вітамін С - водорозчинний антиоксидант із потужною відновлювальною дією. Підвищує неспецифічну резистентність організму.
- Вітамін Е антиоксидант, що запобігає перекисному окисленню ліпідів. Необхідний для біосинтезу гемоглобіну та білків, процесів тканинного дихання, впливає на тонус та проникність судин.
- Селен функціонує через селенпротеїни, основним з яких є глутатіонпероксидаза. Селен взаємодіє з вітаміном Е у захисних процесах.
- Вітаміни групи В є компонентами складних ферментативних систем, що забезпечують нормальний обмін білків, жирів і вуглеводів. Біохімічні та фізіологічні процеси, в яких беруть участь ці вітаміни, тісно взаємопов'язані.
- Часто зустрічаються комбіновані прояви дефіциту кількох вітамінів цієї групи, тому їх необхідно приймати у комплексі.
- Вітамін В1 – кофермент ензимів метаболізму вуглеводів та амінокислот з розгалуженими ланцюгами. Забезпечує нормальне функціонування нервової системи, серцевої діяльності та ендокринних залоз.
- Вітамін В2 входить до складу флавінових ферментів, що беруть участь у транспорті кисню (тканинному диханні) та утворенні АТФ у мітохондріях, численних окислювально-відновних процесах.
- Вітамін В6 як коензим бере участь в обміні амінокислот, глікогену, сфінгоїдних основ та синтезі нейромедіаторів.
- Пантотенова кислота входить до складу коензиму А та фосфопантотеїну, відіграє значну роль у процесах регенерації ендотелію та метаболізму жирних кислот.
- Вітамін В3 (нікотинамід) функціонує як косубстрат або коензим дегідрогеназ для перенесення іону водню.
- Вітамін В12 необхідний для синтезу нуклеотидів та метаболізму жирних кислот, процесів метилювання. У комплексі з фолієвою кислотою він забезпечує нормальний гематологічний та неврологічний статус.
- Фолієва кислота є коензимом одноуглецевих переносників у метаболізмі нуклеїнових кислот та амінокислот. Стимулює еритропоез, бере участь у

синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів та піримідинів, а також в обміні холіну.

- Біотин входить до складу ферментів, що регулюють білковий, жировий та вуглеводний обмін. Бере участь у синтезі пуринових нуклеотидів. Є джерелом сірки, що бере участь у синтезі колагену.
- Адекватне надходження вітаміну K1 є необхідним для профілактики остеопорозу, що має регулюючий вплив на процеси згортання крові.
- Вітамін D, кальцій, магній, цинк, мідь, марганець і бор сприяють запобіганню розвитку остеопорозу та його ускладнень (насамперед переломів кісток). Без достатнього споживання йоду порушується синтез тиреоїдних гормонів та регуляція ними багатьох метаболічних процесів, особливо синтезу протеїнів та ензиматичної активності. Органами-мішенями для них є мозок, м'язи, серце, гіпофіз та нирки.
- Залізо входить до складу численних ферментів, відповідальних за транспорт кисню до тканин: гемопротейни (гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів), залізо-сірчаних ензимів (флавопротейнів, гемофлавопротейнів), протеїнів для зберігання та транспорту заліза (трансферину, лак, лак . Достатнє надходження заліза забезпечує доставку кисню до тканин та функціонування дихального ланцюга, підвищує неспецифічну резистентність.
- Ванадій може гальмувати синтез жирних кислот, пригнічувати утворення холестерину.
- Молібден потрібен щоб підтримувати в нормі стан зубної тканини та забезпечує профілактику карієсу; регулювати обмінні процеси та процеси зростання; стимулює ферменти, що забезпечують синтез аскорбінової кислоти та нормальне тканинне дихання.
- Хром бере участь у метаболізмі глюкози, посилюючи дію інсуліну.

Показання

Дієтична добавка може бути рекомендована для корекції раціонів харчування дорослих, як додаткове джерело вітамінів: A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12, B3 (нікотинамід), B5 (пантотенової кислоти), фолієвої кислоти, біотину, та мінеральних речовин: магнію, заліза, цинку, марганцю, міді, йоду, селену, хрому, молібдену, ванадію, містить кальцій.

Протипоказання

Не слід застосовувати людям, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту, вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю.

Особам, які мають захворювання щитовидної залози, слід проконсультуватися з лікарем-ендокринологом.

Спосіб застосування та дози

Дорослим – по одній таблетці на добу під час їди.

Термін споживання – 2-3 тижні.

Курс можна повторити через місяць після погодження з лікарем (за потреби).

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +15 °С до +25 °С та при відносній вологості повітря не вище 60 %.

Упаковка

По 30 таблеток у банці, по 1 банці в упаковці.

Виробник

Eagle Nutritionals, Inc/Unipharm, Inc, США.