

Склад

діюча речовина: екстракт рідкий з кореневищ з коренями родіоли рожевої (Rhodiolae radix);

1 флакон препарату містить екстракт рідкий з кореневищ з коренями родіоли рожевої (Rhodiolae radix) (1 : 1) (екстрагент - етанол 40 %) 25 мл або 50 мл.

Лікарська форма

Екстракт рідкісний.

Основні фізико-хімічні властивості: - Рідина темно-бурого кольору з характерним ароматом.

Фармакотерапевтична група

Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.

Фармакодинаміка

Екстракт родіоли рідкий належить до групи тонізуючих засобів, характеризується адаптогенними властивостями завдяки вмісту у кореневищах з коренями органічних кислот, дубильних речовин, бета-ситостерину, двох кристалічних речовин: п-оксифеніл- β -етанолу п-тирозину і його глікозиду п-оксифеніл- β -(β - α глюкопіранозиду)-етанолу родіолізиду.

Препарат підвищує стійкість організму до несприятливих факторів (переохолодження, перегрівання, кисневе голодування, різні стреси), послаблює психічне напруження, підвищує розумову і фізичну працездатність за рахунок оптимізації енергетичних процесів і стимуляції функцій центральної нервової системи. Отримано експериментальні дані про антиаритмічну дію екстракту родіоли рідкого.

Фармакокінетика

Не вивчалась.

Показання

Астенічні стани, підвищена втомлюваність, неврастенія, вегетосудинна дистонія, період реконвалесценції, зниження працездатності.

Протипоказання

Артеріальна гіпертензія, пропасниця, підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік (до 18 років).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Препарат може посилювати вплив інгібіторів моноаміноксидази й інших психостимулювальних засобів.

Особливості застосування

Родіоли екстракт рідкий не рекомендують приймати у другій половині дня для попередження безсоння, з обережністю призначають препарат особам із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не виявлена.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказане.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують дорослим внутрішньо по 5-10 крапель 2-3 рази на день за 10 хвилин

до їди. При астенії, у психіатричній практиці призначають спочатку 10 крапель 2-3 рази на день, поступово підвищуючи дозу до 30-40 крапель на прийом.

Тривалість лікування

1-2 місяці.

Діти

Не призначати дітям (віком до 18 років).

Передозування

На сьогодні інформації про випадки передозування не надходило. Можлива надмірна збудливість, при якій рекомендується відмінити препарат.

Побічні реакції

З боку центральної нервової системи: підвищена збудливість, безсоння, головний біль.

З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску.

Можливі випадки підвищеної чутливості до препарату, при яких необхідна десенсибілізувальна терапія.

Лабораторні дослідження: гіпоглікемія.

У разі появи небажаних симптомів слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання

Упаковка

По 25 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Біолік».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладизин, вул. Незалежності, 131, Ш.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).