

Склад

Активні інгредієнти: обезвожена глюкоза, цитрат натрія, натрія хлорид, калія хлорид.

допоміжні речовини: ароматизатор клубники.

Лікарська форма

Растворимый регидратант.

Первая линия при лечении острой диареи (согласно рекомендациям ВОЗ, UNICEF и ESPGHAN)

EASYSalt – эффективная профилактика обезвоживания:

- сбалансированный и адекватный состав,
- легкий и удобный в использовании,
- приятный вкус (клубнично-лимонный вкус).

Удобная порционная форма приёма.

Можно растворить в 1 стакане кипяченой или бутылированной воды (прямо в бутылке).

Жидкая форма = быстрый эффект

Действует быстрее таблеток.

Своевременное начало регидратации позволит быстро остановить диарею и восстановить энергию, устранить другие симптомы обезвоживания и существенно улучшить самочувствие.

Пероральная регидратация – единственный способ компенсации утраченных электролитов и жидкости. Своевременная и адекватная регидратация поможет избежать развития осложнений.

Показання

- Гостра діарея;
- блювання;
- підвищена температура;
- інтенсивні фізичні навантаження;
- зневоднення;

- опіки.

Європейська асоціація гастроентерологів рекомендує обов'язкову оральну регідrataцію як першу лінію лікування гострої діареї.

Протипоказання

Індивідуальна нестерпність до компонентів. У період вагітності та годування груддю використовувати лише після призначення лікаря. Особам з підвищеним артеріальним тиском, а також особам, які мають захворювання серця, цукровий діабет використовувати тільки під наглядом лікаря. Продукт не призначений для застосування особам з порушенням функції нирок, алкалозом, порушеннями свідомості та всмоктуванням вуглеводів. Якщо протягом 24 годин після початку використання стан не покращиться, зверніться до лікаря.

Продукт не призначений для парентерального введення.

Спосіб застосування та дози

Вміст 1 саші розвести у 200 мл води кімнатної температури.

Приймати дорослим за такою схемою:

У перші 4-6 годин з моменту виникнення перших симптомів (період первинної (активної) регідrataції): 3-8 саше розвести у відповідній кількості води.

Застосувати протягом перших 4-6 годин невеликими порціями.

Підтримуюча регідrataція: розвести 1 саше 200 мл води. Приймати по необхідності та/або після кожного нападу блювання та/або діареї.

Не додавати в сік, чай чи молоко.

Блювота не є протипоказанням до застосування та зазвичай проходить під час вживання.

Кількість рідини, яку слід вживати, залежить від ступеня зневоднення та маси тіла.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Упаковка

10 саше у картонній корорбці.

Виробник

ПП "Євро-Плюс", Україна.