

Склад

1 капсула містить діючі речовини: чорниці екстракту сухого стандартизованого (25 % антоціанідинів)* у перерахуванні на антоціанідини 44,25 мг, лютеїну 20 % FS у перерахуванні на лютеїн 6 мг, зеаксантину 20 % FS у перерахуванні на зеаксантин 1,2 мг;

допоміжні речовини: лецитин, віск жовтий, олія соняшникова;

склад оболонки желатинової капсули: желатин, гліцерин, вода очищена, метилпарагідроксibenзоат (E 218), пропілпарагідроксibenзоат (E 216), титану діоксид (E 171), діамантовий блакитний (E 133), заліза оксид чорний (E 172), кармоїзин (E 122).

* екстрагент етанол 70 %.

Властивості

Дія засобу Мегазір обумовлена комплексною дією активних компонентів: сухого екстракту чорниці, лютеїну і зеаксантину.

Екстракт чорниці містить антоціаніди, які чинять протизапальну та антиоксидантну дію. Вони сприяють покращенню реологічних властивостей крові зменшуючи тромбоутворення, укріпленню стінки кровоносних судин (ефект зумовлений здатністю антоціанідів впливати на регуляцію біосинтезу колагену), а також прискорюють відновлення знебарвленого родопсину.

Специфічні каротиноїди лютеїн та зеаксантин містяться у кришталіку і сітківці ока та забезпечують захист фоторецепторних клітин від кисневих радикалів, індукованих світлом.

Лютеїн і зеаксантин чинять антиоксидантну, екранізуючу та поглинаючу дію.

Рекомендації щодо застосування

Профілактика та в складі комплексного лікування:

- міопії;
- діабетичної ретинопатії;
- гіпертонічної ретинопатії; порушень механізмів адаптації зору до темряви як при нічному, так і при сутінковому зору;
- дистрофічних захворювань сітківки; вікової макулярної дегенерації сітківки;
- катаракти;

- оклюзії судин сітківки;
- зорової астенопії (у тому числі у дітей віком від 7 років).

Мегазір застосовують також для профілактики погіршення зору при підвищеному зоровому навантаженні на очі, для усунення ознак зорової стомленості, а також у комплексній відновлювальній терапії при станах після оперативного втручання (ФРК, відшарування сітківки тощо).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Застереження

Препарат застосовують дітям віком від 7 років після консультації з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям віком від 7 років застосовують по 1 капсулі 2-3 рази на добу після їди протягом місяця, далі – по 1 капсулі 1 раз на добу протягом наступних двох місяців.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у захищеному від вологи та світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, по 2 блістери в пачці.

Виробник

ВРУП "Мінскінтеркапс", Україна.