

Опис

Живі бактерії *Bacillus subtilis*, які входять до складу Субалін, мають високу антагоністичну активність по відношенню до патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів (стафілококів, ентеробактерій, дріжджоподібних грибів роду *Candida*) і сприяють нормалізації якісного і кількісного складу кишкової мікрофлори (біфідумбактерій, лактобацил, кишкової палички), а також характеризуються антивірусною активністю внаслідок синтезу $\alpha 2$ -інтерферону.

Субалін сприяє нормалізації мікрофлори кишечника, попередження та корекції дисбіозу, зниження рівня ендогенної інтоксикації, підвищує опірність організму до вірусних інфекцій. За рахунок стійкості до кислого середовища шлунка в незміненому вигляді проникають в кишечник, де перетворюються у вегетативні клітини.

Субалін рекомендується вживати як дієтичну добавку до раціону харчування, яка є джерелом активної культури *Bacillus subtilis*, для дорослих і дітей від народження з метою нормалізації мікрофлори кишечника і поліпшення його функціонального стану в ситуаціях, пов'язаних з підвищенням ризику кишкових порушень, в тому числі при зміні раціону харчування, переїзді, подорожах; для поліпшення травлення, підвищення імунітету і загальної опірності організму інфекціям дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту; запобігання дисбіозу і антибіотико діареї під час прийому антибіотиків.

Особливості застосування

Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів добавки.

Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного вживання.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Перед вживанням добавки слід проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози

Вживати всередину у формі розчину за 30-40 хв до їди.

Дітям від народження: по 1 саше 2 рази на добу.

Дорослим: по 2 саше 2-3 рази на добу. Дорослим доцільно вживати Субалін-Форте, що містить $2 \cdot 10^9$ живих мікробних клітин *Bacillus subtilis*.

Спосіб розчинення.

Вміст саше розчинити в 50-100 мл охолодженої до кімнатної температури кип'яченої води. Добавку розчиняти протягом 1-2 хв до утворення суспензії. Не розбавляти гарячою рідиною! Неприпустимо зберігання після розчинення.

Рекомендований курс - 20 днів.