

Склад

1 таблетка містить листя сени екстракт 90 mg (мг) (з вмістом кальцію сенозидів А і В 15 % - 13,5 mg (мг)).

допоміжні речовини: стабілізатор крохмаль кукурудзяний; наповнювач целюлоза мікрочастична; глазуруючий агент полівінілпіролідон (PVP K-30); антиспікаючі агенти тальк, магнію стеарат; консервант бензоат натрію (E 211).

Показання

Сенадексин Ананта може бути рекомендовано як дієтична добавка до раціону харчування, біологічно активні речовини якої полегшують дефекацію при закрепах та станах, що потребують зниження щільності калових мас. Сенадексин Ананта може бути застосований для очистки кишечника перед діагностичними процедурами.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період годування груддю, діти до 12 років.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Прийом Сенадексину Ананта рекомендовано дітям від 12 років та дорослим. Дорослі та підлітки від 12 років: рекомендовано приймати по 1 таблетці один раз на добу. За необхідності дозу збільшують до 2-3 таблеток на добу або згідно рекомендації лікаря. Таблетку рекомендовано застосовувати ввечері перед сном, запивати водою та приймати всередину незалежно від прийому їжі.

Термін вживання: 7-14 днів, або приймати за рекомендацією лікаря. За необхідності курс Сенадексину Ананта можна повторювати.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Упаковка

По 20 таблеток у блістері, по 25 блістерів в упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія