

Склад

1 таблетка шипуча масою 4,5 g (г) містить: Спори *Bacillus coagulans* Unique IS-2 (2,00 × 10⁹ КУО); Кислота лимонна, безводна; натрію бікарбонат (1,15 g (г), у перерахунку на натрій - 15,7% *); Калію бікарбонат (0,46 g(г), у перерахунку на калій - 9%*); Шпинат (126 mg (мг)); Вітамін С (40 mg (мг), 50%*); Алое Віра (43 mg (мг)); Базилік (29 mg (мг)); Паростки Пшениці (29 mg (мг)); Хлорелла (19 mg (мг)); Лемонграс (19mg (мг)); М'ята (15 мг (мг)); Морінги (15mg (мг)); Цинк (10 mg (мг) - 100%*); Спіруліну (9 mg (мг)); Вітамін Е (7,5 mg (мг) / 11 IU (МО) - 62,5% *); Вітамін В5 (5 мг (мг) - 83% *); Вітамін В6 (2mg (мг) -142% *); Вітамін А (600 µg (мкг) - 75% *); Вітамін D3 (10 µg (мкг) / 400 IU (МО) - 200% *); Вітамін В12 (1,0 µg (мкг) - 40% *);

допоміжні компоненти: натуральний ароматизатор лимона, маніт, сукралоза, натуральний ароматизатор апельсина, магнію стеарат, кроскармеллоза, кремнію діоксид.

* - відсоток від добової референсної величини споживання вітамінів та мінеральних речовин (для осіб віком від 18 років).

Опис

Загальні властивості

Bacillus coagulans використовують у разі необхідності вироблення молочної кислоти, яка знижує рН у товстій кишці. Зниження рівня рН підвищує перистальтику в товстій кишці, відповідно зменшує час проходження кишечника, що сприяє полегшенню запорів.

Також *Bacillus coagulans* можуть використовуватися при необхідності у підтримці балансу ліпідів за рахунок зниження вмісту гідроксил-метил-глутарил-коферменту-А-редуктази в печінці та перетворенні надлишкового холестерину в жовчні кислоти. Крім того, *Bacillus coagulans* можуть застосовуватися при необхідності ферментної декон'югації жовчних кислот. Після декон'югування жовчні кислоти легко виводяться через кишечник, що також сприяє зниженню рівнів холестерину в сироватці крові. Надлишковий аліментарний холестерин використовується *Bacillus coagulans* шляхом включення до клітинних мембран під час зростання.

До складу Пробізі® Імуно також входять мінеральні речовини, вітаміни та поживні рослини, які беруть важливу участь в обмінних процесах організму та необхідні для відновлення балансу електролітів. Також вітамінам належить

виключно важлива роль у забезпеченні адекватної імунної відповіді організму. Достатня кількість вітамінів є важливою у підтримці стійкості організму до різних інфекцій, дії отрут, радіоактивного випромінювання та інших несприятливих зовнішніх факторів.

Показання

Вітаміни, мінеральні речовини та пробіотичні мікроорганізми *Bacillus coagulans*, що входять до складу Пробізі® Імуно, рекомендуються для підтримання нормального метаболізму та здорової мікрофлори кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Пробізі® Імуно бажано вживати окремо від антибіотиків (через 2 години після прийому антибіотиків).

Не перевищувати вказану кількість (порцію), що рекомендується, для щоденного споживання.

Особливості застосування

Перед вживанням бажано отримати консультацію лікаря, особливо за наявності алергії до компонентів. Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Пробізі® Імуно не є лікарським засобом.

Людям з непереносимістю складових продукту слід попередньо проконсультуватися з лікарем та з обережністю вживати Пробізі® Імуно.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Рекомендується проконсультуватися з лікарем перед вживанням під час вагітності та лактації.

Спосіб застосування та дози

Перед вживанням таблетки Пробізі® Імуно необхідно розчинити у склянці (150 мл) води, отриманий розчин слід одразу випити. Пробізі® Імуно вживається по 1 таблетці 1 раз на добу під час їди. При вживанні Пробізі® Імун рекомендується випивати достатню кількість рідини протягом доби (1-1,5 літра).

Діти

Можна вживати дітям віком від 14 років. Дітям від 14 років по 1 таблетці 1 раз на добу під час їди.

Побічні реакції

Можливі такі небажані прояви, як послаблення випорожнень, незначний метеоризм, дискомфорт у животі. Якщо небажані прояви не проходять через 1-2 дні, слід проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не вживати після закінчення терміну придатності.

Упаковка

По 10 таблеток шипучих у тубі. По 1 тубі у картонній коробці з листком-вкладишем.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Юнік Біотек Лімітед.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Пліт №2, Фейз-II, Ем. Ен. Парк Колтур Вілледж, Шамірпет Мандал, Медчал Малкайгірі Дистрикт, Хайдерабад - 500078, Телангана, Індія.