Склад

Склад на 1 стік: 6x10(9) Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium.

Допоміжні речовини: L-аскорбінова кислота, полідекстроза, порошок овочевої пасти, FOS-волокна, порошок апельсинової смакової добавки, лактулоза, апельсиновий ароматизатор, молочний ароматизатор, крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат.

Властивості

Біолакт Форте містить бактерії з чотирма шарами покриття (Quadruple Coating), що забезпечує високий рівень виживання та збереження активності живих бактерій у зовнішньому середовищі (протягом виробничого процесу та зберігання), та захищає бактерії від дії шлункового соку та жовчі.

Завдяки системі покриття збільшується кількість живих бактерій, які досягають кишечника, що сприяє їх адгезії та розмноженню на епітеліальних клітинах кишечника.

Захисне покриття не порушується, поки на бактерії не почне впливати pH-середовище в тонкому кишечнику, в якому ефекти пробіотики.

Після розчинення покриття в кишечнику бактерії регідруються і починають активно розмножуватися, в тому числі завдяки наявності в Біолакт Форте пребіотиків - лактулози та фруктоолігосахариди, які є поживним субстратом для корисних бактерій.

Унікальна оболонка та система захисту максимізує рівень виживання бактерій та суттєво збільшує їх ефективність у порівнянні з непокритими бактеріями.

Бактерії, що входять до складу Біолакт Форте, колонізують різні відділи травного тракту, що забезпечує відновлення балансу кишкової мікрофлори як у тонкому, так і в товстому відділах кишківника. Це, у свою чергу, підвищує неспецифічну резистентність організму, підтримує рівновагу імунної, нервової та інших систем, покращує засвоєння поживних речовин та вітамінів.

Ліофілізація бактерій та подвійна оболонка забезпечують тривале збереження високої біологічної активності мікроорганізмів при кімнатній температурі.

Показання

Порошок Біолакт Форте рекомендується:

- для відновлення балансу мікрофлори кишечника та усунення наслідків антибіотикотерапії (дисбактеріозу кишечника, антибіотик-асоційованої діареї, псевдомембранозного коліту) під час та після прийому антибіотиків;
- при порушенні рівноваги кишкової мікрофлори (дисбактеріозі);
- підтримки нормальної функції травлення;
- для усунення проявів шлунково-кишкових розладів: запор, діарея, метеоризм (у тому числі – пов'язаних із зміною харчового режиму та раціону, води, стресом та ін.);
- під час корекційного (дієтичного) харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба, гастроентерит, коліт, синдром подразненої товстої кишки, порушення всмоктування, інфекційні кишкового захворювання);
- для підтримки нормальної функції травлення в умовах постійних стресів та застосування сучасних продуктів, що містять компоненти, що несприятливо впливають на мікрофлору кишечника;
- у комплексі заходів щодо усунення дисбактеріозу піхви у жінок;
- при лактазній недостатності;
- при алергічних захворюваннях (атопічний дерматит, екзема та інші алергодерматози, харчова алергія);
- для покращення загального стану при синдромі хронічної втоми;
- у комплексі заходів при остеопорозі, у тому числі у жінок у період менопаузи (для покращення засвоєння кальцію).

Є корисним для дітей у період зростання, оскільки покращує біодоступність вітамінів та мінералів.

Протипоказання

Не застосовувати Біолакт Форте у разі алергії на його компоненти.

Спосіб застосування та дози

Для підтримки нормальної травної функції дорослим та дітям старше 3-х років по 1 стику 1 раз на день 7-14 днів. Один - чотири курси на рік.

За наявності шлунково-кишкових розладів, дорослим та дітям старше 3-х років рекомендується приймати по 1 стику 2-3 рази на день 7-14 днів. За потреби термін вживання може бути продовжений до 1 місяця.

Під час прийому антибіотиків курс Біолакт Форте становить час прийому антибіотиків плюс 4 тижні після закінчення курсу антибіотикотерапії. На стадії

прийому антибіотиків можливе збільшення дози Біолакт Форте до 2 стиків 2-3 рази на день.

Проміжок часу між прийомом антибіотика та Біолакт Форте повинен становити не менше 3-х годин.

Пробіотики є фізіологічними для людини продуктами, тому передозування ними практично неможливе.

На відміну від фармакопейних препаратів, пробіотики в дитячому віці (за винятком дітей перших трьох років життя) призначають майже в тих же дозах, що й дорослим.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Уникати сонячного світла, високих температур та високої вологості.

Упаковка

Порошок у стиках, по 10 стиків у картонній упаковці.

Виробник

Ildong Bioscience Co., Ltd/Ildong Pharmaceutical Co., Ltd, Корея.