

Склад

1 таблетка містить:

- Кора каперсів колючих 70 мг.
- Насіння цикорію дикого 70 мг.
- Заліза оксид - 10 мг.
- Паслін чорний - 42 мг.
- Кора терминалии арджуна - 32 мг.
- Касія західна - 25 мг.
- Насіння деревію звичайного - 26 мг.
- Тамарікс Гальський - 20 мг.

допоміжна речовина - тальк.

Без ГМО.

Опис

«Лів-Кер ®» є комбінованим гепатопротектором рослинного походження, що сприяє захисту гепатоцитів від впливу шкідливих факторів, що стимулюють регенерацію гепатоцитів і синтез білка. Препарат сприяє нормалізації вироблення і виділення жовчі.

Особливості

- Проявляє гепатопротекторну, антитоксичну, протизапальну, жовчогінну активність;
- покращує процес травлення, стимулює гемопоез;
- при алкогольному ураженні печінки сприяє збільшенню виведення ацетальдегіду;
- при хронічному алкоголізмі перешкоджає інфільтрації ліпідів у печінку;
- забезпечує захист печінки від 4-хлористого вуглецю;
- при циротичних станах затримує розвиток захворювання і перешкоджає подальшому пошкодженню печінки;
- стимулює синтез білків, сприяє регенерації клітин печінки, відновлює функціональну здатність;
- покращує апетит, сприяє відходженню газів з кишечника;
- збільшує масу тіла при виснаженні.

Показання

- Для профілактики та лікування хронічних дифузних захворювань печінки, алкогольного ураження печінки, радіоактивних та хіміотерапевтичних уражень печінки;
- як спосіб підвищення стійкості при гепатотоксичних ураженнях печінки;
- для прискорення одужання в період одужання після важких захворювань, операцій;
- холецістоангіохоліти та дискінезії жовчовивідних шляхів.

Протипоказання

Не приймати при підвищеній чутливості до окремих компонентів.

Діти віком до 5-ти років.

Відсутні клінічні дані про безпеку препарату для вагітних та жінок, які годують грудьми.

Спосіб застосування та дози

Рекомендоване дозування:

- дорослим і дітям старше 14-ти років - по дві таблетки 3 рази на добу.
- дітям від 5-ти до 14-ти років - по одній таблетці 3 рази на добу.

Тривалість лікування визначає лікар залежно від захворювання і ступеня тяжкості захворювання.

Запобіжні заходи

Не є лікарським засобом.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо використання препарату.

При одночасному застосуванні «Лів-Кер ®» та ібупрофену рівень останнього в організмі зменшується внаслідок затримки всмоктування.

При одночасному застосуванні з тетрацикліном або доксицикліном зменшується біодоступність антибіотиків.

Побічні реакції

Можливі диспепсичні явища, прояви алергічних реакцій (в разі появи будь-яких небажаних реакцій необхідно порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату).

Умови зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі від +10 °С до +30 °С.

Упаковка

По 60 таблеток в банці; по 1 банці в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

LOBSTER OVERSEAS