

Склад

2 капсули (добова доза) містять активні речовини:

- ПНЖК Омега-3 - 900 мг.
- ПНЖК Омега-6 - 132 мг.
- ПНЖК Омега-9 - 532 мг.
- Вітамін Е - 20 мг.

допоміжні речовини: розчин желатину, гліцерин, оксиди заліза (E172).

Без ГМО.

Лікарська форма

Дієтична добавка для нормалізації серцевої діяльності і поліпшення обмінних процесів.

Фармакологічні властивості

- Рибний жир багатий поліненасиченими жирними кислотами омега-3, де найбільш важливими є альфа-ліноленова, ейкозапентаєнова (ЕПК) і докозагексаєнова (ДГК) кислоти, які сприяють регуляції вмісту холестерину в крові, тим самим захищаючи артерії від освіти холестеринових відкладень, беруть участь в жировому обміні і зниженні кров'яного тиску.
- Лляна олія - містить ПНЖК омега-6, куди входить лінолева кислота, яка сприяє регуляції жирового і білкового обміну, запобігання накопичення холестерину в судинах, перешкоджає виникненню тромбів, грає важливу роль в метаболічних процесах.
- Оливкова олія має високий рівень вмісту жирних кислот омега-9 - олеїнової кислоти.
- Область застосування: додаткове джерело ПНЖК Омега-3 (ейкозапентаєнової кислоти і альфа-ліноленової кислоти), ПНЖК Омега-6 (лінолевої кислоти), вітаміну Е.

Показання

«Доппельгерц[®] Актив Омега 3-6-9» - збалансовані компоненти жирних кислот і вітаміну Е, які сприяють нормалізації серцевої діяльності і поліпшення обмінних процесів.

В складі комплексного лікування:

- серцево-судинної системи, цукрового діабету, нервової системи, гормональної системи;
- жінкам у період проявів гормональної перебудови організму для відновлення гормонального балансу;
- вагітним жінкам для формування мозку і сітківки ока зростаючого плоду;
- жінкам після пологів, для попередження виникнення симптомів післяпологової депресії;
- людям, які знаходяться на суворій дієті та прагнуть схуднути, оскільки Омега 6 та Омега 9 – є ефективними активаторами схуднення.

Протипоказання

Не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів препарату.

Особливості застосування

Дана продукція не є препаратом медичного призначення.

Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям з 14 років - по 1 капсулі 2 рази на день. Тривалість прийому 1 місяць. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом.

Діти

Застосовувати дітям з 14 років.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток в блістері, по 6 блістерів у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Німеччина.