

Склад

100 мл бальзаму містить: активні інгредієнти: екстракт кори сосни звичайної (*Pinus pinaster*) - 15 г, екстракт квітів первоцвіту справжнього (*Primula veris*) - 10 г, екстракт квітів ромашки (*Matricaria z chamomilla*) - 9 г, екстракт шишок хмелю (*Humulus lupulus*) - 0,8 г, екстракт кореня тирличу жовтого (*Gentiana lutea*) - 0,3 г;

допоміжні речовини: сік айви, цукор, вода очищена.

Опис

Екстракт кори сосни звичайної містить ефірні масла, дубильні речовини і смоли, які мають виражену бактерицидну, протизапальну і імуномодулюючу дію, захищають кровеносні судини, відновлюють колагеновий шар в стінках кровеносних судин, зміцнюючи їх. Мають помірні гіпотензивні властивості, сприяють поліпшенню кровообігу.

Екстракт квітів первоцвіту (примули) справжнього містить сапоніни, аглікони і вітамін С; проявляє відкашлювальну, відхаркувальну, протизапальну, антисептичну властивості. У народній медицині використовують і потогінні властивості даної лікарської рослини.

Екстракт квітів ромашки має бактериостатичну, протизапальну, антиоксидантну, спазмолітичну, імуномодулюючу, заспокійливу дію, що обумовлено вмістом біологічно активних речовин - глікозидів, флавоноїдів, кверцетину, кумаринів, полісахаридів, фітостеринів, дубильних речовин.

Екстракт шишок хмелю має протівірусні та антибактеріальні властивості, а також виявляє седативну, тонізуючу і зміцнюючу дію (за рахунок вмісту ефірних масел, хмельових смол, гірких і дубильних речовин, глікозидів, флавоноїдів).

Екстракт кореня тирличу жовтого містить глікозиди, іридоїди, флавоноїди, катехіни; має протизапальні та антисептичні властивості, позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт, підвищує апетит.

Показання

Сінорм Бальзам рекомендований як додаткове джерело ефірних масел, дубильних речовин, сапонінів, агліконів, вітаміну С, глікозидів, флавоноїдів, кверцетину, хмельових смол, глікозидів та іридоїдів з метою підвищення

імунітету і нормалізації функціонального стану верхніх і нижніх дихальних шляхів при:

- риніт;
- фарингіти;
- гострий і хронічний синусит (катаральні та гнійні гайморити, етмоїдити, фронтит, сфеноїдити, полісинусит) гострому і хронічному тонзиліті;
- ларингіти;
- трахеїти;
- трахеобронхіти;
- гострому і хронічному бронхіті;
- бронхопневмонії.

Протипоказання

Вагітність і період лактації, індивідуальна непереносимість компонентів.

Спосіб застосування та дози

Приймати дорослим і дітям старше 12 років і старше по 5 мл (1 мірна ложка) 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років - по 5 мл (1 мірна ложка) 2 рази на добу, дітям віком від 3 до 6 років - по 2,5 мл (½ мірної ложки) 2 рази на добу. Приймати незалежно від прийому їжі. Перед застосуванням збовтати. Тривалість прийому становить 2-3 тижні.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Хранить в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 15 °С до 25 °С. Після відкриття флакона зберігати при температурі від 15 °С до 25 °С і використати впродовж 2 місяців.

Упаковка

По 100 мл у флаконі.

Виробник

AD Smart LLC, Латвія.