

## **Склад**

1 капсула містить:

- Глюкозамина сульфат - 750 мг;
- Хондроїтину сульфат - 100 мг.

*Вказівки для хворих на цукровий діабет:* 1 капсула містить 3,8 ккал/59 кДж і не містить хлібних одиниць.

## **Опис**

«Доппельгерц актив Глюкозамін + Хондроїтин» - капсули для відновлення хрящової тканини і захисту суглобів.

## **Властивості**

Хондроїтин і глюкозамін беруть активну участь в біосинтезі сполучної тканини, стимулюють регенерацію хрящової тканини, запобігають і сповільнюють резорбцію кісткової тканини.

Глюкозамін є будівельним матеріалом для хрящової тканини, при нестачі його в організмі посилюються процеси дегенерації хрящової тканини, виникає запалення, що в кінцевому підсумку веде до остеоартрозу. Введення екзогенного глюкозаміна підсилює вироблення хрящового матриксу, що і створює неспецифічний захист від хімічного пошкодження хряща. Позитивна дія глюкозамінсульфат на організм людини і функціональну активність опорно-рухового апарату доведено в численних клінічних дослідженнях.

Для збільшення ефекту глюкозамін доцільно поєднувати з хондроїтином.

Останній є високомолекулярним мукополісахаридом, який у високих кількостях міститься в хрящах, кістках і сполучної тканини. Хондроїтінсульфат уповільнює резорбцію кісткової тканини і знижує втрату кальцію, покращує фосфорно-кальцієвий обмін у хрящовій тканині, прискорює процеси її репарації, гальмує процес дегенерації хрящів і руйнування сполучної тканини. Пригнічує ферменти, що негативно впливають на хрящові комплекси (еластаза, гіалуронідаза), стимулює синтез глюкозамінгліканов, сприяє регенерації суглобової сумки, підтримує в'язкість синовіальної рідини.

## **Показання**

- при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів і хребта (остеоартроз, остеохондроз);
- при підвищеному навантаженні на суглоби (зайву вагу, заняття спортом, інтенсивне фізичне навантаження);
- при травмах суглобів і сухожиль;
- при обмеженні рухливості (наприклад, при сидячій роботі);
- під час менопаузи і в похилому віці;
- для профілактики передчасного стирання хрящів в суглобах.

## **Протипоказання**

Не приймати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, вагітним і годуючим жінкам.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим - по одній капсулі 2 разів на день під час або після їжі.

Запивати достатньою кількістю води.

Рекомендований термін споживання - 1-2 місяці, повтор курсу можливий за рекомендацією лікаря.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери в упаковці.

## **Виробник**

Квайссер Фарма ГмбХ і Кою КГ, Німеччина.