

## **Склад**

1 флакон містить:

*активні інгредієнти:* гідролізат колагену FORTIGEL - 10,0 г, аскорбінова кислота (вітамін С) - 60 мг;

*допоміжні речовини:* вода, фруктоза, регулятор кислотності лимонна кислота, барвник солодовий екстракт ячменю, ароматичні речовини, консервант сорбат калію, підсолоджувачі: ацесульфам калію, циклакат натрію, сукралоза.

## **Властивості**

Профлекс - продукт, виготовлений на основі гідролізату колагену FORTIGEL. Гідролізат колагену FORTIGEL тропний до тканин суглобів. Гідролізат колагену FORTIGEL надходить в організм і використовується для побудови клітин хрящової і сполучної тканин.

Гідролізат колагену FORTIGEL сприяє:

- компенсації дефіциту внутрішнього колагену в сполучній і хрящовій тканинах;
- підтримці необхідної пружності та еластичності тканин, зокрема хрящової;
- функціональної мобільності суглобів.

До складу продукту входить також вітамін С, який бере участь в синтезі колагену в хрящовій тканині, захищає клітини від вільних радикалів, а також має важливе значення для підтримки функціонального стану кісток і сполучної тканини.

Завдяки властивостям гідролізату колагену FORTIGEL і вітаміну С Профлекс сприяє поліпшенню синтезу внутрішнього колагену (з віком цей процес порушується).

Гідролізат колагену FORTIGEL вживають для поліпшення функціонального стану опорно-рухового апарату:

- при надмірній масі тіла і при болю в суглобах;
- при щоденних надмірних фізичних навантаженнях;
- при регулярних заняттях спортом і дотриманні активного способу життя;
- при появі ознак порушення функціонування суглобів (хрускіт, обмеження рухливості, ранкова скутість).

## **Рекомендації щодо застосування**

Профлекс використовується:

- в складі комплексної терапії артрозу, остеоартрозу та остеоартриту;
- для відновлення після травм і оперативних втручань на суглобах;
- при підвищених фізичних навантаженнях і регулярних заняттях спортом;
- для профілактики захворювань опорно-рухового апарату з метою поліпшення функціонального стану суглобів.

Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування для дорослих і дітей у віці від 12 років в якості додаткового джерела гідролізату колагену і вітаміну С з метою поліпшення функціонального стану опорно-рухового апарату.

### **Спосіб застосування**

Перед вживанням необхідно струсити флакон.

Вживати дорослим і дітям у віці старше 12 років по 1 флакону (25 мл) на добу незалежно від прийому їжі.

Курс вживання - не менше 3 міс, якщо лікар не призначив інакше.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу!

### **Застереження**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту. Перед початком вживання дієтичної добавки і при одночасному вживанні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Не слід вживати Профлекс в період вагітності та годування груддю.

### **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.

### **Форма випуску**

Розчин флакон 25 мл, № 14