

## **Склад**

*1 ампула (10 ml (мл)) розчину містить:*

- цитидину 5'-монофосфат -150 mg (мг);
- уридину 5'-монофосфат -150 mg (мг);
- цинк-1,5 mg (мг).

*Допоміжні речовини:* вода очищена, підсолоджувачі (сорбітовий сироп, мальтит), стабілізатор (гліцерин), цитідін-5-монофосфат, уридин-5-монофосфат, регулятор кислотності (кислота лимонна), ароматизатор, консерванти (калію сорбат, натрію бензоат), сульфат цинку, барвник (цукровий колер).

## **Лікарська форма**

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей з підсолоджувачами.

Дієтична добавка до раціону харчування в якості джерела поживних речовин, що сприяють покращенню трофіки та відновленню пошкоджених нервових волокон при невралгіях та поліневропатіях різного походження.

## **Показання**

Аксотроф — комплекс нуклеотидів і цинку, необхідних для покращення трофіки і відновлення пошкоджених нервових волокон при невралгіях і полінейропатіях, підсилює метаболічні процеси, що сприяють регенерації.

***Аксотроф можна застосовувати при:***

- інфекційних(вірусних) пошкодженнях нервів;
- в лікуванні люмбаго, ішіасі, радикуліті;
- постравматичній, ішемичній невропатії;
- невралгіях, невриті нервного тригеміну, плекситах;
- остеоартикулярній невралгії (люмбаго, люмбалгіях, люмбоішіалгіях, радикулопатіях), межреберних невралгіях;
- метаболічних невралгіях (наслідки алкогольної залежності, ускладнення діабету — полінейропатія);
- гангліониті, вертеброгеному болі, паралічі Белла, міопатіях, синдромі кистьового тунелю;
- тяжких, легких і середніх невропатіях різного генезу;
- міжпозвонкових радикулопатіях).

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.

## **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до компонентів засобу, вагітність та період лактації.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Ефективність та безпечність споживання в період вагітності та годування груддю не встановлені, тому не рекомендується застосовувати продукт в цей період.

## **Спосіб застосування та дози**

Аксотроф призначений для внутрішнього вживання без необхідності розведення, але вміст ампули може бути розведено в воді. Для розведення відламайте кінець ампули з одного боку.

- Обережно переверніть ампулу відламані краєм над склянкою з водою (100 ml (мл)) і відламайте інший кінець: рідина почне витікати відразу після відламування іншого кінця.
- Дорослим рекомендується приймати 1 ампулу один раз в день після їди. Тривалість споживання визначає лікар індивідуально.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

## **Термін придатності**

36 місяців від дати виробництва.

Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° C, в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 10 мл розчину в ампулах, 20 ампул у картонній упаковці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

Лабіалфарма, С.А., Едіфісіо Лабіалфарма, Португалія.