

Склад

1 капсула містить:

Діючі речовини:

- Екстракт трави споришу - 160 мг.
- Екстракт листя берези - 13,40 мг.
- Екстракт кореневища пирію - 20,10 мг.
- Екстракт коренів петрушки - 10,05 мг.
- Екстракт трави хвоща польового - 6,7 мг.
- Екстракт коренів любистку - 6,7 мг.
- Екстракт трави золотушника - 5,75 мг.

Допоміжні речовини: желатин, вода, целюлоза, титану діоксид, діоксид кремнію, магнієві солі жирних кислот, оксид заліза жовтий, мідні комплекси хлорофілів.

Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки - 0,18 г; вуглеводи - 0,52 г; жири - 0 г; насичені жирні кислоти - 0,2 м

Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту - 382 ккал (1621кДж).

Без ГМО.

Лікарська форма

Дієтична добавка. Капсули для лікування захворювань сечостатевої системи і нирок.

Опис

- Спориш звичайний (*Polygonum aviculare* L.) - з лікарською метою використовують молоді пагони в період цвітіння. Містить вітаміни С і має сечогінну, жарознижувальну, протиглистовим, в'язким, загальнозміцнюючу, тонізуючу, кровоспинну і протизапальну дію.
- Пирій повзучий (*Agrorugon reptans* L.) в народній медицині застосовують як сечогінний, потогінний, відхаркувальний, проносний і регулює сольовий обмін засіб. При желче- і сечокам'яній хворобах, нефриті, циститі, нетриманні сечі, гепатиті, холециститі, геморої, гастриті, ентериті, коліті, простудних захворюваннях, трахеїті, пневмонії, ексудативному діатезі, екземі, фурункульозі, гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті.

- Екстракт листя берези (*Betula pendula* Roth. (*B. Verrucosa* Ehrh.)) Широко використовують при захворюваннях нирок, недокрів'ї, як сечогінний і потогінний засіб.
- Хвощ польовий (*Equisetum arvense* L) збільшує виділення сечі, зменшує кількість білка в ній, поліпшує загальний обмін речовин в організмі, зменшує набряки, зменшує запалення, сприяє загоєнню ран, має кровоспинний, в'язучий, антисептичний і дезинфікуючий дію.
- Коріння любистку (*Levistici radix*) мають сечогінну, вітрогінну, спазмолітичну (знімає кишкові кольки), болезаспокійливу, тонізуючу властивостями. Активізує статеву функцію у чоловіків і нормалізує протягом менструації у жінок. Застосовується при ряді захворювань сечових шляхів: пієлонефрит, цистит, гломерулонефриті і сечокам'яної хвороби.
- Трава золотушника (*Extractum Herbae Solidaginis virgaureae siccam*) має протизапальну дію. Надає спазмолітичну дію на гладку мускулатуру сечовивідних шляхів.
- Одночасно екстракт золотушника має антибактеріальну дію, в тому числі по *Staphylococcus aureus*, *St. epidermidis*, *St. Faecalis*, *Bacillus subtilis* і інші. Активні речовини екстракту гальмують зростання ряду грибів *C. albicans*, *C. krusei*, *C. tropicalis* і інші. Запобігає каменеутворенню шляхом розведення сечі і зниження концентрації в ній літогенних субстанцій. Оскільки запалення і звуження сечовивідних шляхів пов'язано з наявністю сечових каменів, важливе значення для вторинної профілактики має діуретична та протизапальна дії золотушника.

Показання

Рекомендується в раціон харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження при інфекціях нирок і сечового міхура для: підтримання правильного функціонування нирок (коріння петрушки, трави хвоща польового, кореневища пирію і листя берези), підтримання нормального функціонування сечовивідних шляхів (трави хвоща польового, коріння любистку, трави золотушника і листя берези), сприяння видалення води з організму, допомагає видалити з сечею небажані продукти обміну речовин (кореневища пирію, коріння любистку, трави золотушника і листя берези), допомоги в усуненні патогенних бактерій з сечовивідних шляхів. Позитивно впливає на зменшення грампозитивної мікрофлори на стінках сечовивідних шляхів (трава споришу). Має протизапальні, спазмолітичні, антибактеріальними і сечогінні властивості.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окремих компонентів препарату.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Продукт не повинен використовуватися в якості заміни повноцінного харчування.

Не є лікарським засобом.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Жінкам в період вагітності та годування груддю слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням.

Спосіб застосування та дози

Дітям від 3-х років і дорослим - по одній капсулі 2 рази на добу, запиваючи водою (бажано не менше 0,5 склянки води).

Приймати перед їжею.

Термін застосування - до 30-ти днів по одній капсулі 2 рази на добу.

Профілактично - 2 рази в рік по 10 днів по одній капсулі 2 рази на добу.

Діти

Застосовувати дітям з 3 років.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від вологи, світла і недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Польфарма СА», Польща.