

Опис

Бандаж білий післяопераційний розмір 3 – це хірургічний бандаж для черевної стінки, який виготовляється з багатошарового сучасного матеріалу. Прилегла до спини і передньобічна частина здійснює фіксацію та виконана з бандажного еластичного полотна, друга переднебічна частина на животі, зроблена з багатошарового матеріалу з махровим бавовняним полотном.

Через Бандаж післяопераційного проводиться фіксація передньої стінки очеревини, що не дає розходитися ранам і дозволяє знизити біль в районі постопераційної рани. Додатково відтворюються умови для нормального загоєння післяопераційної рани та утворення рубців.

Розмір	Обхват талії, см	Склад:	
1	60-70	латекс - 27%, поліефір - 73%	Висота бандажу: 24 см
2	71-80		
3	81-90		
4	91-100		
5	101-110		
6	111-120		
7	121-130		

Особливості Бандажу післяопераційного

- виготовлений із сучасного трипльованого матеріалу та пружно-еластичного полотна. Його внутрішня частина виконана з махрового бавовняного полотна;
- покращує м'язовий тонус черевної стінки;
- профілактує розвиток післяопераційної грижі;
- створює оптимальні умови для загоєння ран та формування рубців;
- надійно фіксує черевну передню стінку та не дає розходитися краям рани;
- мінімізує болючі відчуття після оперативного втручання.

Показання

Легкая компрессия и поддерживание мышц брюшного пресса в тонусе после травм, при грыжах, опущениях почек и операций в этой области.

Рекомендуется женщинам для скорейшего приведения мышц живота в прежнее состояние после родов.

Радикулит, радикулопатия пояснично-крестцового отдела, люмбалгии и люмбоишиалгии, грыжи межпозвонковых дисков.

Используется после кесарева сечения. Рекомендовано для лиц, работа которых связана с нагрузкой на позвоночник и вибрациями (водители, мотоциклисты, грузчики, спортсмены).

Противопоказання

Опис забороняє використовувати післяопераційний бандаж при:

- синдром портальної гіпертензії;
- невправних грижах черевних стінок;
- діафрагмальної грижі;
- локальних дерматитах та гнійничкових інфекціях шкірного покриву.

Попередження

За наявності захворювань шкіри, і особливо при гнійних недугах у зоні застосування бандажу слід пройти консультацію у фахівця. При високій чутливості шкіри потрібно надягати бандаж на спідню білизну, яка щільно прилягає до тіла. Наявність будь-якого дискомфорту вимагає негайно припинити носіння бандажу та проконсультуватися з фахівцем щодо можливостей його подальшого застосування.

Упаковка

Захисна упаковка.

Виробник

ПП "ТОРОС-ГРУП", Україна