

## **Склад**

*діюча речовина:* 100 мл препарату містить: аміаку розчину концентрованого (у вигляді 25 % розчину) 44 мл;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, дуже лужна рідина з різким запахом. Допускається, при зберіганні, наявність блискіток і/чи легкої каламуті.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що впливають на респіраторну систему. Код АТХ R07A B.

## **Фармакодинаміка**

Аміаку розчин належить до лікарських засобів, які подразнюють нервові закінчення. Механізм дії аміаку при вдиханні полягає у рефлекторному збудженні дихального центру через рецептори верхніх дихальних шляхів – закінчення трійчастого нерва.

При нанесенні на шкіру чинить подразнювальну та антимікробну дію.

## **Фармакокінетика**

Препарат не надходить до кров'яного русла.

## **Показання**

Непритомний стан, при укусах комах.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до лікарського засобу.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не встановлена.

## **Особливості застосування**

Місцеве застосування можливе лише на неушкоджену шкіру.

При випадковому ураженні слизової оболонки ока промивати водою декілька разів (протягом 15 хв з перервою 10 хв) або 3 % розчином борної кислоти. Олії і мазі не застосовують. При ураженні носа і глотки застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі прийому всередину – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Для збудження дихального центру як засіб швидкої допомоги: невеликий шматочок марлі або вати, змочений розчином аміаку, обережно підносять до носових отворів на 0,5 – 1 с.

При укусах комах розчин аміаку застосовують зовнішньо у вигляді примочок (тривалість процедури – до 30 секунд).

## **Діти**

Препарат не застосовують дітям до 3 років.

## **Передозування**

Посилення проявів побічних реакцій.

Терапія симптоматична.

## **Побічні реакції**

При вдиханні парів розчину аміаку може виникнути рефлекторна зупинка дихання. При місцевому застосуванні можливі подразнення, дерматити, екзема у місці аплікації, алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 40 мл у флаконах.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика»

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).