

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 балон містить хлорбутанолу гемігідрату 0,1 г; камфори рацемічної 0,1 г; левоментолу 0,1 г; олії евкаліптової 0,1 г;

*допоміжні речовини:* ізопропілміристат, хладон 134а.

## **Лікарська форма**

Аерозоль.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна або злегка жовтуватого кольору рідина зі специфічним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що діють на респіраторну систему. Антисептики. Код ATX R02A A20.

## **Фармакодинаміка**

Каметон чинить протизапальну, антисептичну і легку місцевознеболювальну дію. У механізмі дії відіграє роль рефлекторна реакція (подразнення чутливих нервових закінчень) і стимуляція утворення і вивільнення ендорфінів та інших біологічно активних ендогенних речовин, що регулюють бульові відчуття і проникність судин. Комбіноване поєднання хлорбутанолгідрату, камфори та олії евкаліптової чинить протизапальну ті дезінфекційну дію, полегшує відокремлення в'язкого секрету, що накопичується у верхніх відділах дихальних шляхів. Левоментол діє як м'який місцевоанестезуючий агент, має дезодораційний ефект.

## **Фармакокінетика**

Не досліджувалася.

## **Показання**

Місцеве лікування гострих і хронічних (переважно у стадії загострення) інфекційно-запальних захворювань горла та носа: тонзиліту, фарингіту, ларингіту, риніту.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

### **Особливості застосування**

Не розпилювати поблизу вогню. Препарат слід з обережністю застосовувати дітям, оскільки можливий розвиток бронхоспазму. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.

Перед застосуванням Каметону ротову порожнину слід прополоскати теплою кип'яченою водою. Перед введенням препарату у порожнину носа слід очистити ніс від слизу. При обробці слизових оболонок горла препарат слід застосовувати після їди. Балон з препаратом не розбирати і не давати дітям, оберігати від ударів. Після застосування препарату на розпилювач надіти захисний ковпачок, щоб запобігти його забрудненню. При уприскуванні у ніс не закидати голову і не перевертати балон. Не рекомендується користуватися одним і тим же балоном кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції. Під час розпилювання препарату слід уникати попадання в очі. Перед застосуванням препарату особам, склонним до алергії, слід обов'язково проконсультуватися з лікарем.

При опіках з уражених ділянок стерильним тампоном зняти некротичний наліт.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не встановлена.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказань до застосування препарату у період вагітності або годування груддю не виявлено. Застосовувати препарат у цей період слід за призначенням лікаря.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат призначають дорослим і дітям віком від 5 років. Для застосування препарату необхідно з розпилювача зняти захисний ковпачок, потім розпилювач ввести у порожнину носа на глибину 0,5 см або рота і натискати на основу розпилювача до упору. Вміст балона при цьому розпилюється у

дрібнодисперсному стані. За 1 натиск розпилюється 0,1 г препарату, який містить сумарно 1,33 мг діючих речовин. Каметон слід розпилювати у порожнину носа або рота на фазі вдиху по 2-3 розпилювання 3-4 рази на добу.

Тривалість лікування безперервно зазвичай становить 6-7 діб (визначає лікар індивідуально). Препарат не слід застосовувати довше 1 тижня.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років під наглядом лікаря.

## **Передозування**

Передозування препаратору може спричинити посилення побічних ефектів. Терапія симптоматична.

*Лікування:* припинення застосування препаратору, симптоматична терапія.

## **Побічні реакції**

*З боку імунної системи:* алергічні реакції, включаючи крапив'янку, свербіж, висипання на шкірі, набряк у місці контакту, в осіб із підвищеною чутливістю можливий розвиток ангіоневротичного набряку (набряк Квінке).

*З боку дихальної системи:* задишка, відчуття сухості слизової оболонки горла та носа.

*Місцеві ефекти:* відчуття першіння або печіння у роті.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препаратору і обов'язково звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати препаратор після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.

### **Упаковка**

По 30 г у балоні аерозольному алюмінієвому; по 1 балону з розпилювачем в пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

АТ «Стома», Україна.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

61105, Україна, м. Харків, вул. Ньютона, 3.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).