

## **Склад**

*діюча речовина:* ambazone;

1 льодяник пресований містить амбазону моногідрату 10 мг;

*допоміжні речовини:* цукроза, лактози моногідрат, какао, повідон К-30, кислота стеаринова, ванілін.

## **Лікарська форма**

Льодяники пресовані.

*Основні фізико-хімічні властивості:* коричневі, не вкриті оболонкою, циліндричної форми льодяники пресовані, з непошкодженими краями, плоскі та з пігментованою поверхнею.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Амбазон. Код АТХ R02A A01.

## **Фармакодинаміка**

Амбазон є місцевим антисептиком, який має високу активність щодо патогенних мікроорганізмів, що найчастіше спричиняють інфекції ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів: стрептококів, пневмококів, – а також має помірну протистафілококову активність. Не впливає на кишкову мікрофлору, отже, не спричиняє дисбіозу травного тракту.

Крім того, застосування льодяників пресованих збільшує слиновиділення та виділення природних бактерицидних речовин організму (таких як лізоцим) і разом з цим зволожує слизову оболонку, зменшує подразнення.

## **Показання**

Симптоматичне лікування інфекцій слизової оболонки порожнини рота та носоглотки: гінгівіт, стоматит, тонзиліт, ангіна, фарингіт. Профілактика інфекційних ускладнень після тонзилектомії та екстракції зубів.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

На цей час не повідомлялося про взаємодію препарату з будь-якими іншими лікарськими засобами.

## **Особливості застосування**

Оскільки ледяники Фарингосепт містять цукрозу та лактозу, пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості фруктози або галактози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози, недостатністю сахарази-ізомальтази або дефіцитом лактази Лаппа слід уникати застосування препарату. Хворим на цукровий діабет слід враховувати те, що ледяники містять цукрозу.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Немає контрольованих клінічних досліджень щодо застосування амбазону у період вагітності або годування груддю. Однак, не надходило жодних даних про побічні реакції або шкідливий вплив на плід при застосуванні амбазону у період вагітності. Невідомо, чи проникає амбазон у грудне молоко.

Ледяники Фарингосепт можна призначати у період вагітності або годування груддю тільки у тому випадку, якщо, на думку лікаря, терапевтичний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода.

## **Спосіб застосування та дози**

Рекомендована доза препарату для дорослих та дітей віком від 7 років становить 3-5 ледяників (30-50 мг амбазону) на добу протягом щонайменше 3-4 днів.

Ледяники не слід ковтати – їх слід повільно розчинити слиною у порожнині рота. Препарат зазвичай застосовують одразу після їди (через 15-30 хвилин), після чого протягом 2-3 годин не слід приймати їжу і пити.

Рекомендована доза дітям віком 3-7 років – по 1 ледянику 3 рази на добу (30 мг амбазону на добу) протягом 3-4 днів.

Збільшення рекомендованої дози не спричиняє покращення терапевтичного ефекту.

## **Діти**

Не застосовувати дітям віком до 3 років.

## **Передозування**

Досі не було зафіксовано випадків передозування препаратом. Специфічного антитоду не існує. При застосуванні дуже великої кількості ледяників Фарингосепт рекомендується викликати блювання та/або промити шлунок.

## **Побічні реакції**

Можливі реакції гіперчутливості, у тому числі набряк Квінке, кропив'янка, свербіж, гіперемія шкіри обличчя, висипання.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 10 ледяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

КК Терапія АТ/С.С. Terapia S.A.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

вул. Фабриції, 124, 400632, м. Клуж-Напока, округ Клуж, Румунія/

Str. Fabricii nr. 124, cod 400632 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).