

Склад

діюча речовина: екстракт рідкий (60:100) квітів соняшника (flores helianthi) (екстрагент - етанол 70%);

1 мл препарату містить екстракту рідкого (60:100) квітів соняшника (flores helianthi) (екстрагент - етанол 70%)(у перерахунку на суху речовину) 330 мг;

допоміжні речовини: пропіленгліколь; метилпарабен (Е 218); пропілпарабен (Е 216); сахарин натрію; кислота лимонна, моногідрат; вода очищена.

Лікарська форма

Спрей оромукозний, розчин.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Різні антисептики.

Код АТХ R02A A20.

Фармакодинаміка

Екстракт квітів соняшника - антибактеріальний препарат природного походження. Біологічно активні речовини, які у ньому містяться, пригнічують ріст деяких бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Bacillus subtilis*), а також вірус везикулярного стоматиту. Крім того, при місцевому застосуванні препарат чинить виражену ранозагоювальну дію.

Фармакокінетика

Не вивчалась.

Показання

Гострі респіраторні захворювання, ангіни, ларингіти, фарингіти, профілактика везикулярного стоматиту.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Препарат підсилює дію інших антибактеріальних препаратів.

Особливості застосування

Флакони струшують протягом 1 хв та проводять не більше 5 натискань на насадку до появи дисперсного струменя. Дозволяється при відсутності струменя повторити операцію ще раз. Потім вільний кінець розпилювача ввести у порожнину рота та натискати на голівку клапана протягом 1-2 с, утримуючи флакон вертикально.

Допоміжні речовини можуть спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені), а в окремих випадках – бронхоспазм.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Оскільки ніяких досліджень застосування препарату у період вагітності або годування груддю не проводилось, його застосування не рекомендується.

Спосіб застосування та дози

Місцево, шляхом зрошення, на слизові оболонки ротової порожнини та носоглотки. Дорослим зрошення проводять 3-4 рази на добу. Тривалість застосування залежить від інтенсивності терапії та зазвичай становить від 3 до 7 днів.

Діти

Дослідження щодо застосування дітям не проводились, тому препарат не рекомендується.

Передозування

Не спостерігалось.

Побічні реакції

Допоміжні речовини можуть спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені), а в окремих випадках – бронхоспазм. Можливе виникнення відчуття печіння у задній частині глотки, що не потребує відміни препарату.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 мл у флаконі з насосом-дозатором з розпилювачем, по 1 флакону в пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Біолік».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).