

Склад

діюча речовина: цинку оксид;

1 г присипки містить цинку оксиду 0,1 г;

допоміжні речовини: тальк, крохмаль картопляний.

Лікарська форма

Порошок.

Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору, м'який, жирний на дотик порошок.

Фармакотерапевтична група

Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією.

Препарати цинку.

Код АТХ D02A B.

Фармакодинаміка

Адсорбуючий, підсушувальний, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу.

Цинку оксид спричиняє денатурацію білків і утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болючих відчуттів, звужують кровоносні судини, ущільнюють клітинні мембрани.

Препарат зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.

Фармакокінетика

Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не проявляють системної дії.

Показання

Попрілості.

Протипоказання

Гіперчутливість до компонентів препарату, гострі гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Інформація відсутня.

Особливості застосування

Препарат не застосовувати при інфікованих ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Не слід наносити препарат на вологу шкіру.

Поліпшення стану настає після дворазового або триразового застосування препарату. Не слід допускати потрапляння препарату в очі, дихальні шляхи і на відкриту поверхню рани.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовувати зовнішньо. Присипку наносити на суху ділянку поприлостей після купання та при замінах пелюшок.

Термін лікування залежить від перебігу захворювання, його визначає лікар індивідуально.

Діти

Застосовувати дітям.

Передозування

Не відзначалося.

Побічні реакції

При підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні реакції (свербіж, гіперемія, висипання).

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г у контейнері полімерному.

По 50 г у банці, по 1 банці у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «ВІТАМІНИ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).