

## **Склад**

Один пессарий містить: 10 мг гіалуронат натрію, крохмаль, молочну кислоту;

*допоміжні речовини:* натрію лактат і напівсинтетичні гліцериди.

## **Лікарська форма**

Песарії вагінальні.

## **Фармакологічні властивості**

Песарії «Молвагін™» зволожують вагінальну слизову оболонку, сприяють її регенерації, допомагають підтримати природний рівень рН і захистити піхву від несприятливих зовнішніх чинників.

- Гіалуронат натрію захищає і зволожує вагінальну слизову оболонку, сприяє загоєнню тканин і їх регенерації.
- Молочна кислота допомагає підтримати природний рівень рН слизової оболонки ( $\text{pH} \leq 4,5$ ) для зменшення ризику.
- Глікоген створює захисний бар'єр і є джерелом поживних речовин для молочнокислих бактерій, які формують здорову вагінальну мікрофлору, захищаючи піхву від інфекцій і допомагаючи підтримати природний рівень рН.
- Песарії розчиняються після введення в піхву і створюють плівку, яка покриває слизову оболонку, допомагає відновити природний стан вагінального епітелію.

## **Показання**

Для полегшення сухості і дискомфорту (відчуття напруженості, свербіння, печіння) в інтимних зонах, викликаних:

- недовіком естрогенів (протягом перименопаузи і так далі);
- атрофією вагінальної слизової оболонки;
- підвищеним стресовим станом.

Песарії сприяють процесу регенерації вагінальної слизової оболонки:

- протягом періоду менопаузи, в разі атрофії вагінального епітелію;

- при дистрофії вагінального епітелію, викликаного, наприклад, вживанням гормональних препаратів (в тому числі антагоністів гонадоліберину GnRH, глюкокортикостероїдів);
- після хіміотерапії, радіотерапії;
- після гінекологічних процедур (наприклад, кольпоскопії, електрокоагуляції, кріоабляції і хірургічного втручання, наприклад, епізіотомії);
- в післяпологовому періоді.

Для полегшення болю при больових відчуттях при статевому акті.

Для зменшення дискомфорту при набряку, почервонінню і свербінню в зоні вульви, а також надмірних вагінальних виділеннях.

Песарії допомагають підтримати природну мікрофлору і рівень рН слизової оболонки, наприклад, після лікування антибіотиками.

### **Особливості застосування**

Не застосовувати препарат дані песарії, якщо у Вас підвищена чутливість до будь-якого інгредієнта препарату.

У разі вагінальних інфекцій рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Внаслідок недостатньої кількості проведених досліджень, вагітним і годуючим жінкам можна використовувати препарат тільки під медичним наглядом.

Не застосовувати препарат разом з іншими вагінальними препаратами.

Якщо застосовувати препарат разом з знеболюючими засобами місцевого застосування, це може привести до збільшення анестезії, оскільки препарат містить гіалуронат натрію.

Не застосовувати препарат в період менструацій.

Не вступати в статевий акт відразу після введення пессарія.

Не застосовувати препарат разом з презервативами або вагінальними контрацептивами, зробленими з латексу, оскільки препарат містить модифіковані жири.

Не ковтати.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Тримати подалі від світла і в місці, яке недоступне для дітей.

Не застосовувати препарат, якщо blister пошкоджений.

Якщо були виявлені які-небудь побічні реакції після введення пессарія (посилений свербіж, печіння, висипання і так далі), необхідно припинити терапію і проконсультуватися з лікарем.

Щоб уникнути забруднення білизни, надіньте гігієнічні захисні засоби.

Кожен пессарий можна використовувати тільки один раз. Повторне використання одного і того ж пессарія може привести до ризику вагінального зараження.

### **Спосіб застосування та дози**

1. Ретельно вимити руки.
2. Якщо пессарий дуже м'який унаслідок дії високої температури, необхідно помістити його в холодильник на кілька хвилин перед тим, як вийняти з фольги.
3. Відірвати один пессарий від blisterи, повільно відокремити два шари, які його покривають, зняти їх і обережно дістати пессарий.
4. Обережно помістити пессарий глибоко в піхву. Для полегшення введення пессарий можна зволожити в теплій кип'яченій воді.

### Рекомендоване дозування:

- базова терапія - 1 пессарий ввечері перед сном протягом 7-ми днів підряд або за рекомендаціями лікаря;
- підтримуюча терапія - 1 пессарий ввечері перед сном кожні 2-3 дні до поліпшення здоров'я або по рекомендацій лікаря.

Якщо підтримуюча терапія слід за базовою, то загальна тривалість використання препарату не може перевищувати 30 днів. Потім лікування необхідно призупинити на 7 днів.

Не використовуйте дві дози одночасно і з малими інтервалами часу.

### **Термін придатності**

3 роки від дати виготовлення.

### **Умови зберігання**

Зберігати в щільно закритій упаковці при кімнатній температурі (15-25 ° C) і в сухому місці.

**Упаковка**

По 7 песаріїв у картонній упаковці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

IBSS BIOMED, Польща.