

## **Склад**

*діюча речовина:* хлоргексидин;

1 пісарій містить хлоргексидину диглюконату 20 % розчину у перерахунку на хлоргексидину диглюконат 16 мг;

*допоміжні речовини:* макрогол 400, макрогол 1500.

## **Лікарська форма**

Пісарії.

*Основні фізико-хімічні властивості:* кулеподібні пісарії від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору. Допускається наявність повітряного стрижня або лійкоподібної заглибини.

## **Фармакотерапевтична група**

Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології.

Код ATX G01AX.

## **Фармакодинаміка**

Активний відносно найпростіших, грампозитивних і грамнегативних бактерій: *Treponema pallidum*, *Trichomonas vaginalis*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*. Слабо чутливими до препарату є деякі штами *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.* Не чутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.

## **Фармакокінетика**

При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.

## **Показання**

Профілактика венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз).

Профілактика інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами і

абортом, до і після установки внутрішньоматкової спіралі, до і після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями).

Лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозій шийки матки.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Препарат не можна застосовувати разом з детергентами, що містять аніонну групу (сапоніни, натрію лаурилсульфат, натрію карбоксиметилцелюлоза), а також з мілом. Мило може інактивувати хлоргексидин, тому перед застосуванням препарату залишки мила необхідно ретельно змити. Туалет зовнішніх статевих органів не впливає на ефективність і переносимість песаріїв, оскільки препарат застосовується інтравагінально.

Не рекомендується одночасне застосування з йодом.

## **Особливості застосування**

Потрапляння гіпохлоритних відбілювальних речовин на тканини, що раніше знаходились у контакті з препаратом, який містить хлоргексидин, може сприяти появі коричневих плям на тканині.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Дослідження не проводилося.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не протипоказано.

## **Спосіб застосування та дози**

Препарат застосовується вагінально. Перед застосуванням песарій слід звільнити від контурної чарункової упаковки. Для лікування застосовують по 1 песарію 2 рази на добу. Курс лікування - 7 - 10 днів залежно від характеру захворювання. При необхідності можливе подовження курсу лікування до 20 днів. Для профілактики венеричних захворювань застосовують по 1 песарію не пізніше ніж через 2 години після статевого акту.

## **Діти**

Досвіду застосування в педіатричній практиці немає.

## **Передозування**

Не виявлено.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції, свербіж, що проходять після відміни препарату.

Можливе печіння та подразнення у місці введення песарію.

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі від 2 до 8 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 5 песаріїв у контурній чарунковій упаковці. По 2 контурні чарункові упаковки у пачці з картону.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).