

Склад

Олія ялицева, олія евкаліптова, олія гвоздики, екстракт перцю стручкового, ментол, віск бджолиний, ланолін, вазелін, олія вазелінова.

Властивості

Бджолиний віск – цінний натуральний продукт природного походження, що має високі бактерицидні, протизапальні, ранозагоювальні властивості.

Евкаліптова олія має болезаспокійливу, антисептичну та відхаркувальну дію. Застосовується при лихоманках, різних застудних захворюваннях і респіраторних інфекціях. Олія евкаліпту прекрасно допомагає при захворюваннях шкіри, легко загоює різні виразки, опіки та шкірні інфекції, прискорює загоєння ран.

Олія гвоздики має сильну антимікробну і потогінну дію, тому її можна застосовувати з метою профілактики під час епідемій. Олія гвоздики є знеболюючим засобом, який можна застосовувати при невралгіях, артриті та ревматизмі, а також вона зміцнює імунну систему і надає зігріваючу дію. Застосування олії гвоздики в комплексі з іншими засобами чинить сильну загоюючу дію при запаленні шкірних покривів, попаданні інфекції в рани і виразках, що довго не загоюються.

Ментол надає легку місцеву знеболюючу дію; має також слабкі антисептичні властивості.

Перець стручковий має відволікаючу та місцевоподразнюючу дію.

Ялицева олія сприяє стимуляції імунної системи організму, має антибактеріальні, протизапальні властивості, надає тонізуючий і загальнозміцнюючий ефект.

Рекомендації щодо застосування

Зірочка при застуді бальзам: рекомендований як профілактичний засіб для зовнішнього застосування з метою покращення функціонального стану шкіри, як лікувально-профілактичний засіб при запальних процесах дихальної системи.

Спосіб застосування

Наносити на шкіру верхньої частини грудей і спини вздовж середньої лінії два-три рази на день по 1-2 г (злегка втерти і накрити теплою сухою тканиною) до покращення стану. При профілактичному нанесенні застосовувати протягом 20

днів. Дозволяється чергувати з іншими зовнішніми засобами.

Перед застосуванням обов'язково проводиться проба на чутливість: бальзам наносять на внутрішню поверхню передпліччя і при відсутності гіперемії засіб дозволяється до застосування.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 15 г

Термін придатності

36 місяців