

## **Склад**

*діючі речовини:* 2,2 мл розчину містять: Acidum sarcolacticum D4 – 22 мкл, Aesculus hippocastanum D4 – 22 мкл, Arteria suis D10 – 22 мкл, Barium carbonicum D13 – 22 мкл, Cuprum sulfuricum D6 – 22 мкл, Embryo totalis suis D8 – 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 – 22 мкл, Hypophysis suis D10 – 22 мкл, Melilotus officinalis D6 – 22 мкл, Natrium pyruvicum D8 – 22 мкл, Nicotiana tabacum D10 – 22 мкл, Placenta totalis suis D6 – 22 мкл, Plumbum iodatum D18 – 22 мкл, Secale cornutum D4 – 22 мкл, Solanum nigrum D6 – 22 мкл, Strophanthus gratus D6 – 22 мкл, Vena suis D8 – 22 мкл, Vipera berus D10 – 22 мкл;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

## **Лікарська форма**

Розчин для ін'єкцій.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий безбарвний розчин без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Препарат стимулює периферичний кровообіг, має венотонізуючу, знеболювальну, судинорозширювальну, антиспастичну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

## **Фармакокінетика**

Для гомеопатичних препаратів не визначається.

## **Показання**

Стимуляція периферичного кровообігу при атеросклерозі, облітеруючому ендартеріїті, трофічних виразках, ендометриті, дисменореї, нейроциркуляторній дистонії, дегенеративних та судинних хворобах вуха, при гангренозному стані ніг, спричиненому надмірним палінням і цукровим діабетом; при вузликкових еритемах, слоновості, пролежнях, залишкових порушеннях після енцефаліту та інсульту, помутнінні рогівки.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу. Можливість застосування препарату при захворюваннях щитовидної залози визначає лікарь.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

Якщо симптоми захворювання не зникають або стан пацієнта погіршується необхідно проконсультуватися з лікарем. Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідома.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Випадки негативного впливу невідомі.

## **Спосіб застосування та дози**

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 1 ампула по 2,2 мл.

Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних (в акупунктурні точки) і при необхідності – внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій 1-3 рази на тиждень.

У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 2-3 днів.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

## **Діти**

Немає даних щодо застосування препарату дітям до 12 років.

## **Передозування**

Не відзначалося.

## **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (або анафілактичні реакції). Можливі шкірні висипи, зміни в місці введення.

## **Термін придатності**

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

## **Упаковка**

5 ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

За рецептом.

## **Виробник**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).