

## Склад

- Магнію стеарат - 3.41 мг;
- лактозимоногідрат - 5.59 мг;
- крохмаль картопляний (~ 41% від маси ліофілізату);
- лактозимоногідрат (~ 20.6% від маси ліофілізату);
- натрію глютамат (~ 4.5% від маси ліофілізату);
- натрію тіосульфат (~ 26.8% від маси ліофілізату);
- желатин.

## Опис

Капсули вагінальні прозорі, желатинові. Вміст капсул - порошок світло-жовтого з коричневим відтінком кольору.

*Lactobacillus casei* - грампозитивні палочкоутворюючі анаеробні неспорообразуючі бактерії. *Lactobacillus casei* - нормальна облигатна флора ротової порожнини, кишечника, вульви і піхви людини. *Lactobacillus casei*, поряд з іншими видами лактобактерій (в т.ч. *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus cellobiosum*), представлені в нормальній флорі вульви і піхви жінки.

Колонізація піхви живими паличками *Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini* створює схожу з фізіологічної середу в піхву. Штам *Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini* в складі препарату Лактожиналь володіє антагоністичною активністю щодо широкого спектра патогенних і умовно-патогенних бактерій (включаючи *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, Ентеропатогенну *Escherichia coli*), покращує місцеві обмінні процеси і сприяє відновленню природного місцевого імунітету.

При введенні капсули препарату Лактожиналь в піхву желатинова оболонка капсули розчиняється з вивільненням ліофілізованої культури живих лактобактерій.

In vitro показано, що *Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini* протягом декількох годин після введення призводять до необхідного зниження рН, сприяючи відновленню природної мікрофлори піхви.

Дефіцит лактобактерій є одним з важливих факторів розвитку кандидозних вульвовагінітів. Лактобактерії є фізіологічними антагоністами дріжджоподібних грибів роду *Candida* за рахунок секреції антифунгальних речовин і конкуренції за рецептори на епітеліоцитах піхви (пригнічують прикріплення грибів роду *Candida* до епітеліоцитів піхви, гальмують їх зростання і розмноження).

Результати клінічного дослідження показали ефективність препарату Лактожиналь у відновленні нормальної мікрофлори піхви і профілактиці рецидивуючого кандидозного вульвовагініту при його застосуванні після завершення терапії протигрибковими препаратами.

## **Показання**

Таблетки Лактожиналь ЛП можуть використовуватись:

- після прийому антибактеріальних препаратів;
- повторюваних курсів протигрибкової інфекції.

## **Протипоказання**

1. Кандидоз ("молочниця").
2. Вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлені).
3. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Особливості застосування**

Після введення капсула розчиняється, не залишаючи плям на білизні або запаху. Препарат призначений для застосування у жінок старше 18 років.

## **Спосіб застосування та дози**

Для полегшення введення, змочіть таблетку у невеликій кількості води. Введіть глибоко в піхву перед тим, як лягати спати.

1 таблетка кожні 4 дні:

- для відновлення мікрофлори піхви: 2 таблетки;
- для запобігання рецидиву: 6 таблеток

## **Побічні реакції**

Свербіж, печіння, почервоніння в області статевих органів, посилення слизових виділень з піхви.